Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Департамент научно-технологической политики и образования

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова филиал ФГБОУ ВО Донской ГАУ

УТВЕРЖ	ДАЮ
Декан факульто	ета ЛФ
Д.В. Рябова	
" "	2025 г.

VEDEDMETAIO

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины Б1.О.08 Химия

Направление(я) 35.03.10 Ландшафтная архитектура

Направленность (и) Ландшафтное строительство

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Факультет Лесохозяйственный факультет

Кафедра Экологические технологии природопользования

Учебный план **2025 35.03.10 z.plx**

35.03.10 Ландшафтная архитектура

ФГОС ВО (3++) Федеральный государственный образовательный стандарт

направления высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 35.03.10 Ландшафтная архитектура (приказ

Минобрнауки России от 01.08.2017 г. № 736)

Общая 144 / 4 ЗЕТ

трудоемкость

Разработчик (и): к.с-х.н., доц., Шалашова О.Ю.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры Экологические технологии

природопользования

Заведующий кафедрой к.т.н., доцент Кулакова Е.С.

Дата утверждения плана уч. советом от 29.01.2025 протокол № 5.

Дата утверждения рабочей программы уч. советом от 25.06.2025 протокол № 10

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

4 3ET

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану 144

в том числе:

 аудиторные занятия
 16

 самостоятельная работа
 119

 часов на контроль
 9

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс		1		Итого	
Вид занятий	УП	РΠ		111010	
Лекции	6	6	6	6	
Лабораторные	6	6	6 6		
Практические	4	4	4 4		
В том числе инт.	6		6		
Итого ауд.	16	16	16	16	
Контактная работа	16	16	16 16		
Сам. работа	119	119	119	119	
Часы на контроль	9	9	9 9		
Итого	144	144	144	144	

Виды контроля на курсах:

Контрольная работа	1	семестр
Экзамен	1	семестр

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 - владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки информации

	3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ						
П	икл (раздел) ОП: Б1.О						
3.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:						
3.1.1	Знать:						
3.1.2	современную модель строения атома; химические элементы и их соединения; реакционную способность веществ; периодическую систему элементов в свете строения атома, кислотно- основные и окислительновосстановительные свойства веществ, химическую связь; химическую идентификацию веществ; дисперсные системы и их классификацию; химическую						
3.1.3	термодинамику и кинетику.						
3.1.4	Уметь:						
3.1.5	- определять и рассчитывать pH растворов; количественно описывать реакции превращения веществ; рассчитывать количественное содержание растворенного вещества, осмотическое давление растворов, скорость химических реакций и их направленность.						
3.1.6	Навык:						
3.1.7	- выполнения химического эксперимента						
3.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:						
3.2.1	География						
3.2.2	Общая экология						
3.2.3	Ознакомительная практика						
3.2.4	Почвоведение						
3.2.5	Физика						
3.2.6	Геология						
3.2.7	Геоэкология						
3.2.8	Учение о сферах Земли						
3.2.9	Физика окружающей среды						
3.2.10	Химия окружающей среды						
3.2.11	Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)						
3.2.12	Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика						
3.2.13	Экология растений, животных и микроорганизмов						
3.2.14	Методы экологических исследований						
3.2.15	Научно-исследовательская работа (НИР)						
3.2.16	Системный анализ и оптимизация решений						
3.2.17	Технологическая (проектно-технологическая) практика						
3.2.18	Химические и физико-химические методы анализа						
3.2.19	Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты						
3.2.19	защита выпускнои квалификационнои работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты						

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1 : Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий;

ОПК-1.1 : Использует основные законы математических и естественных наук для решения стандартных задач в области ландшафтной архитектуры

	5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов Курс Индикаторы Литература Интеракт. Примечание						
	Раздел 1. 1. Основные законы химии.						

	_						
1.1	Лек/	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2	0	
	Раздел 2. 2. Строение атома. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева.						
2.1	Строение атома. Строение атома и систематика химических элементов. Периодическая система и изменение свойств элементов. /Лек/	1	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 3. 3.Химическая связь и строение молекул.						
3.1	Химическая связь и строение молекул. Типы химической связи. Строение и свойства молекул. /Лек/	1	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 4. 4.Энергетика химических процессов.						
4.1	Энергетические эффекты химических реакций. Функции состояния. Закон Гесса и следствие из него. /Лек/	1	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 5. 5. Скорость химических реакций и						
	химическое равновесие.						
5.1	Скорость химических реакций и химическое равновесие /Лаб/	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 6. 6. Вода. Общая характеристика растворов.						
6.1	Общая характеристика растворов. Способы выражения состава растворов. Физико-химические свойства растворов неэлектролитов и электролитов (анализ конкретных ситуаций) /Лек/	1	1	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	

6.2	Общая характеристика растворов. Расчет концентрации растворов /Пр/ Раздел 7. 7. Растворы	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	электролитов.						
7.1	Реакции в растворах электролитов. /Лаб/	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
7.2	Свойства растворов. Коллигативные свойства растворов (решение ситуационных задач). /Пр/	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 8. 9. Окислительновосстановительные реакции. Основы электрохимии.						
8.1	Реакции окисления- восстановления /Лаб/	1	2	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 9. 10. Химическая идентификация						
9.1	Изучение теоретических вопросов, выполнение теоретических заданий, решение задач. Выполнение контрольной работы. /Ср/	1	59.5	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 10. 11. Комплексные соединения						
10.1	Изучение теоретических вопросов, выполнение теоретических заданий, выполнение контрольной работы /Ср/	1	59.5	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э1	0	
	Раздел 11. 12. Контроль						

11.1	Подготовка к итоговому	1	9	ОПК-1.1	Л1.1 Л1.2	0	
	контролю освоения дисциплины				Л1.3		
	в форме экзамена. /Экзамен/				Л1.4Л2.1		
					Л2.2 Л2.3		
					Л2.4		
					Л2.5Л3.1		
					Л3.2		
					Э1		

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена:

- 1. Основные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, закон кратных отношений, закон эквивалентов.
- 2. Основные законы химии: закон объемных отношений, закон Авогадро и его следствия. Методы определения молекулярных масс газов.
- 3. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Периоды, группы и подгруппы периодической системы. Связь строения атома с положением элементов в периодической системе.
- 4. Строение атома. Постулаты Бора.
- 5. Квантовые числа, их физический смысл.
- 6. Электронная орбиталь и «квантовая ячейка». Принцип Паули. Правило Хунда.
- 7. Семейства s-, p-, d- и f- элементов в периодической системе элементов. Электронные формулы элементов.
- 8. Зависимость свойств атомов от строения их электронных оболочек. Энергия ионизации и сродство атома к электрону.
- 9. Типы химической связи, их особенности.
- 10. Химическая связь и еѐ основные характеристики.
- 11. Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности. Метод валентных связей.
- 12. Способы образования ковалентной химической связи.
- 13. Гибридизация атомных электронных орбиталей и еè виды.
- 14. Полярность химической связи. Электрический момент диполя молекулы.
- 15. Ионная связь, еѐ особенности. Степень ионности связи.
- 16. Водородная связь, еѐ особенности и влияние на свойства веществ.
- 17. Термохимия, ее основные определения. Закон Гесса и его следствие.
- 18. Внутренняя энергия и энтальпия. Энергетические эффекты химических процессов.
- 19. Макро- и микросостояние вещества. Вероятность состояния системы и энтропия.
- 20. Направленность самопроизвольного протекания химических реакций. Энергия Гиббса.
- 21. Химическая кинетика. Скорость химических реакций в гомогенной и гетерогенной системе.
- 22. Влияние природы реагирующих веществ и температуры на скорость химической реакции.
- 23. Влияние катализатора на скорость химической реакции. Механизм действия катализатора.
- 24. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие.
- 25. Смещение химического равновесия. Принцип ЛеШателье.
- 26. Вода, еѐ физические свойства. Диаграмма состояния воды.
- 27. Аномальные свойства воды, их причина и роль в природе.
- 28. Растворы. Гидратная теория Д.И. Менделеева. Тепловые эффекты растворения.
- 29. Растворимость твердых веществ в жидкостях.
- 30. Растворимость газов в жидкостях.
- 31. Концентрация растворов, еè виды.
- 32. Осмос, осмотическое давление растворов. Закон Вант Гоффа для растворов неэлектролитов и электролитов.
- 33. Понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором. Закон Рауля для растворов неэлектролитов и электролитов.
- 34. Повышение температуры кипения растворов. Закон Рауля для растворов неэлектролитов и электролитов.
- 35. Понижение температуры кристаллизации раствора. Закон Рауля для растворов неэлектролитов и электролитов.
- 36. Теория электролитической диссоциации.
- 37. Применимость законов Вант Гоффа и Рауля к растворам электролитов.
- 38. Слабые электролиты, их диссоциация. Закон разбавления Оствальда.
- 39. Сильные электролиты, их диссоциация. Активность ионов.
- 40. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. Условия необратимости реакций.
- 41. Электролитическая диссоциация воды. Нейтральные, кислые и щелочные растворы.
- 42. Водородный показатель. Шкала рН, методы определения рН.
- 43. Гидролиз, его количественные характеристики. Зависимость гидролиза от концентрации и температуры раствора.
- 44. Гидролиз солей и его виды (на примере уравнений гидролиза соответствующих солей).
- 45. Дисперсные системы, их классификация по агрегатному состоянию фаз.
- 46. Дисперсные системы, их классификация по степени дисперсности. Свободно- и связнодисперсные системы.
- 47. Устойчивость дисперсных систем. Факторы стабилизации дисперсных систем.
- 48. Сорбция и еѐ виды.
- 49. Коллоидные растворы. Строение коллоидной мицеллы.

- 50. Коагуляция коллоидных растворов и факторы, еè вызывающие.
- 51. Типы окислительно-восстановительных реакций.
- 52. Реакции окисления. Важнейшие восстановители.
- 53. Реакции восстановления. Важнейшие окислители.
- Окислительно-восстановительная двойственность. 54.
- 55. Электрохимические системы. Электродные потенциалы и ряд напряжений металлов.
- 56. Коррозия металлов и ее виды.
- 57. Методы защиты от коррозии металлов.
- Понятие химической идентификации. Качественные реакции на ионы. 58.
- 59. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций, реакций ионного обмена, гидролиза солей.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Работа состоит из вопросов, охватывающих курс дисциплины, и выполняется по одному из указанных вариантов. Перечень вариантов заданий контрольной работы, методика ее выполнения и необходимая литература приведены в методических указаниях для написания контрольной работы (Луганская, И.А. Химия [Текст] : метод.указ. по изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. / И.А. Луганская, О.Ю. Шалашова, С.В. Кондратова; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. химии и прикл. экологии. – Новочеркасск, 2013.-66 с.-50 экз.). Выбор варианта определяется первой буквой фамилии студента и последней цифрой зачетной книжки. Каждый студент выполняет контрольную работу в соответствии с вариантом задания, определяемого по двум последним цифрам его шифра (номер студенческого билета и зачетной книжки). Например, шифр студента 30512, т.е. последние цифры его 12. Следовательно, студентом должна быть выполнена контрольная работа, включающая задачи варианта 12 в таблице 2.

Перечень вопросов контрольной работы

- Что называется эквивалентом элемента? Что такое эквивалентная масса? Эквивалентный объ-ем? Рассчитать эквивалентные массы углерода, исходя из состава оксида и диоксида углерода.
- Что называется эквивалентом сложного вещества? Как определяются эквивалентные массы ок-сидов? оснований? Вычислить эквивалентные массы оксидов алюминия Al2O3 и хрома CrO3, гидроксидов аммония NH4OH и бария Ва(ОН)2.
- Что называется эквивалентом сложного вещества? Как определяются эквивалентные массы кислот? Солей? Вычислить эквивалентные массы фосфорной кислоты H3PO4, сероводородной кислоты H2S, сульфата алюминия Al2(SO4) 3 и фосфата кальция Са3(РО4)2.
- Вычислить эквивалентную массу основания, зная, что 2 г его взаимодействуют без остатка с 1,829 г соляной кислоты HCl.
- Вычислить атомную массу двухвалентного элемента, зная, что его соединение с водородом со-держит 5,88 % водорода.
- Вычислить атомную массу четырехвалентного элемента, зная, что его оксид содержит 13,39 % кислорода. 6.
- 7. На восстановление 9,9375 г оксида двухвалентного металла израсходовано 2,8 л водорода, из-меренного при н.у. Чему равны эквивалентные массы оксида, металла, атомная масса металла? Какой это металл?
- На растворение 8,43 г металла потребовалось 7,35 г серной кислоты. Определить эквивалент-ную массу металла и объем выделившегося водорода (условия нормальные).
- Определить эквивалентную массу и название двухвалентного металла, 2,24 г которого вытес-няют из раствора серебряной соли 4,32 г раствора серебра.
- Определить эквивалентную массу и название двухвалентного металла, 0,12 г которого вы-тесняют из кислоты 112 мл водорода, измеренного при нормальных условиях.
- При сжигании 0,9 г трехвалентного металла получено 1,7 г его оксида. Определить атомную массу металла и 11. составить формулу его оксида.
- 12. Сколько молей и эквивалентов составляют 342 кг сульфата алюминия Al2(SO4)3?
- 13. Сформулировать закон Авогадро и его следствия. Какой объем занимают 1022 молекул азота при нормальных условиях? Какую массу имеет это количество азота?
- 14. Что такое моль? Сколько молей содержится в 1 м3 любого газа при нормальных условиях?
- 15. Плотность паров серы по кислороду равна 8. Из скольких атомов состоит молекула серы?
- 16. Масса 1 л криптона при нормальных условиях равна 3,71 г. Из скольких атомов состоит мо-лекула газа криптона?
- Какой объем при нормальных условиях занимают: a) 7 кг N2; б) 32 г H2; в) 1 т оксида азота NO? 17.
- 18 Масса 1 л одного из газов равна 1,34 г, а другого – 1,26 г. Вычислить молекулярные массы этих газов, их плотность по водороду и число молекул в 1 л каждого газа.
- Сколько а) молей; б) молекул водорода содержится в 5 м3 этого газа, измеренного при нор-мальных условиях? 19
- 20. Какой объем при нормальных условиях занимают: а) 0,1 моль оксида азота N2O; б) 0,5 экви-валента водорода Н2; в) 0,3 моль оксида углерода СО?
- 21. Какие вещества называются оксидами? Дать классификацию оксидов, привести примеры и дать систематические названия.
- 22. Что является важнейшим признаком основных оксидов? Привести примеры соответствую-щих реакций и дать названия взаимодействующих веществ по систематической номенклатуре.
- Что является важнейшим признаком кислотных оксидов? Привести примеры соответствую-щих реакций и дать названия взаимодействующих веществ по систематической номенклатуре.
- В чем особенность амфотерных оксидов? Какие из приведенных ниже оксидов обладают амфотерными свойствами: ZnO, FeO, NiO, Al2O3, Fe2O3? Подтвердить амфотерность соответ-ствующих гидроксидов реакциями и назвать взаимодействующие вещества по систематической номенклатуре.
- 25. Какие вещества называют основаниями? Написать формулы гидроксидов, соответствующих оксидам: Си2О, FeO,

Al2O3, PbO, CaO и назвать их по систематической номенклатуре.

26. С какими из перечисленных ниже веществ может реагировать гидроксид калия (КОН): FeO, ZnO, CO2, Al2O3, SO2? Написать уравнения реакций и назвать взаимодействующие вещества по систематической номенклатуре.

- 27. Какие вещества называются кислотами? Что такое основность кислоты? Привести примеры одно-, двух- и трехосновных кислот. Написать реакции их взаимодействия с гидроксидом натрия и назвать все реагирующие вещества по систематической номенклатуре.
- 28. С какими из оксидов MgO, CO, Fe2O3, P2O5, ZnO может реагировать серная кислота? Напи-сать соответствующие реакции и назвать взаимодействующие вещества по систематической номенклатуре.
- 29. Какие реакции характерны для кислот? Привести примеры таких реакций для азотной кислоты и назвать все взаимодействующие вещества по систематической номенклатуре.
- 30. Какие из перечисленных ниже кислот могут образовать кислые соли: HClO4, H2SO4, CH3COOH, H3PO4, HCl? Написать формулы кислых солей и назвать их по систематической но-менклатуре.
- 31. Какие вещества называются солями? Дать классификацию солей, привести примеры сред-них, кислых, основных солей и назвать их по систематической номенклатуре.
- 32. Назвать соли: SnO(NO3)2, CrOHSO4, Zn(HS)2, Ca(HCO3)2, NaH2PO4, Na2HPO4, Cu2(OH)2CO3.
- 33. Назвать соли: PbCrO4, K2CrO4, K2Cr2O7, KMnO4, Ba(HSO3)2, ZnS, Al(OH)2NO3.
- 34. Назвать соли: Ca3(AsO4)2, CaHAsO3, NH4NO3, Mg(ClO3)2, NH4ClO4, K2HPO3, KH2PO3.
- 35. Из перечня солей, формулы которых приведены ниже, выбрать отдельно: а) основные соли; б) нормальные (средние) соли; в) кислые соли; г) двойные соли; д) кристаллогидраты: CaSO4•2H2O, KHCO3, CuSO4, Na2CO3•10H2O, Na3PO4, PbOHNO3, KAl(SO4)2•12H2O, NH4HS, Mg(ClO4)2, AlOHCl2, NaH2AsO3, Cu2(OH)2CO3.
- 36. Написать уравнения реакций образования солей КЗРО4, Ca(NO3)2, Na2SO4 в результате взаи-модействия: а) основного и кислотного оксидов; б) основания и кислотного оксида; в) основного оксида и кислоты; г) основания и кислоты.
- 37. Написать уравнения реакций образования солей K2CO3, Mg3(PO4)2, Fe(NO3)3 в результате взаимодействия: а) основного и кислотного оксидов; б) основания и кислотного оксида; в) основного оксида и кислоты; г) основания и кислоты.
- 38. Написать уравнения реакций, лежащих в основе получения важнейших удобрений супер-фосфата Ca(H2PO4)2, преципитата CaHPO4, аммофоса NH4H2PO4 и диаммофоса (NH4)2HPO4. Назвать соли, входящие в состав этих удобрений.
- 39. Написать формулы кислот, отвечающих оксидам MnO3, Mn2O7, V2O5, CrO3, P2O5. Написать уравнения реакций взаимодействия этих кислот с гидроксидом калия и назвать полученные со-ли по систематической номенклатуре.
- 40. С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать соляная кислота: N2O5, CaO, Zn(OH)2, H3PO4, Fe2O3? Составить уравнения реакций и назвать полученные вещества по си-стематической номенклатуре.
- 41. Квантовые числа электрона: обозначение, принимаемые значения, физический смысл. Что характеризует главное квантовое число?
- 42. Что характеризует орбитальное квантовое число? Как оно выражается? Что означает понятие «энергетические подуровни»? Чему равно максимально возможное число электронов на каждом из подуровней? Какие формы имеют электронные облака s-, p-, d-, f- электронов?
- 43. Какое из квантовых чисел определяет ориентацию электронного облака в пространстве? Сколько пространственных ориентаций возможно: а) для s- электронов; б) для p- элек-тронов; в) для d- и f- электронов?
- 44. Составить электронную формулу элемента, на М-энергетическом уровне которого находится 10 электронов. Распределить все электроны атома этого элемента по энергетическим ячейкам. В каком периоде, группе и подгруппе периодической системы находится этот элемент?
- 45. Составить электронную формулу элемента, на N-энергетическом уровне которого находится 12 электронов. Распределить все электроны атома этого элемента по энергетическим ячейкам. В каком периоде, группе и подгруппе периодической системы находится этот элемент?
- 46. Сформулировать правило Гунда. Почему на последнем электронном слое у меди и хрома находится только по одному s- электрону?
- 47. Какое максимальное число электронов может находиться на s-, p-, d- и f- подуровнях? При-вести примеры.
- 48. Изобразить строение электронных оболочек атомов железа и криптона
- а) электронной формулой;
- б) энергетическими ячейками.
- 49. Почему во втором периоде периодической системы не может быть более восьми элементов? Объяснить это, исходя из строения атомов.
- 50. Изобразить распределение электронов по квантовым ячейкам в атомах аргона, кальция, фос-фора.
- 51. Что называется нормальным или основным состоянием атома? Что называется его возбуж-денным состоянием? Изобразить распределение электронов по квантовым ячейкам в нормаль-ном и возбужденном состоянии серы и хлора.
- 52. Почему кислород и фтор проявляют постоянную валентность, а их аналоги в VI и VII груп-пах периодической системы сера и хлор переменную? Изобразить распределение электронов атомов этих элементов по квантовым ячейкам в нормальном и возбужденном состояниях.
- 53. Составить полные электронные формулы цезия, германия, ванадия и диспрозия. К каким электронным семействам принадлежат эти элементы?
- 54. Составить полные электронные формулы кальция, меди, свинца и плутония. К каким элек-тронным семействам принадлежат эти элементы?
- 55. Как изменяются свойства р- элементов с увеличением зарядов ядер их атомов: а) в пределах данного периода; б) в пределах данной группы. Ответ проиллюстрировать примерами.
- 56. Какие элементы периодической системы представляют собой самый активный металл и са-мый активный неметалл? Дать объяснения и составить полные электронные формулы этих эле-ментов.
- 57. Что такое потенциал ионизации элемента? Что такое сродство к электрону? Как изменяются эти величины с

возрастанием заряда ядра элементов в пределах: а) группы; б) периода?

58. В чем особенность электронного строения лантаноидов и актиноидов и как она отражается на их химических свойствах?

- 59. Валентные электроны атомов элементов описываются формулами: a) 3d24s2; б) 4d105s1; в) 5s25p6; г) 4d55s1. Назовите эти элементы и составьте полные электронные формулы их атомов.
- 60. В электронных формулах атомов четырех элементов содержится: а) 9 s- электронов; б) 16 p- электронов; в) 14 d- электронов; г) 27 f- электронов. Составить полные электронные формулы этих элементов и назвать их.
- 61. Дать общие представления о возникновении химической связи и ее основных характеристи-ках. Что такое длина связи, ее энергия? Что такое валентные углы? Привести примеры.
- 62. Сформулировать основные положения метода валентных связей (ВС). Описать с позиций метода ВС строение молекул H2 и N2.
- 63. Привести примеры молекул веществ, в которых атомы соединялись бы ковалентной поляр-ной и неполярной связью. Изобразить схемы строения этих молекул.
- 64. Привести пример молекулы с sp- гибридизацией электронных облаков. Какой угол между связями в этой молекуле? Изобразить ее пространственную схему.
- 65. Привести пример молекулы с sp2- гибридизацией электронных облаков. Какие углы между связями в этой молекуле? Изобразить ее пространственную схему.
- 66. Привести пример молекулы с sp3- гибридизацией электронных облаков. Какие углы между связями в этой молекуле? Изобразить ее пространственную схему.
- 67. Изобразить структурные формулы соединений K2CrO4, K2Cr2O7, K2MnO4, KNO2. Чему равны степени окисленности элементов в этих соединениях? Какие типы химических связей имеют место в их молекулах?
- 68. Что такое σ и π связи? Изобразить геометрическую схему образования молекул H2 и N2. Сколько σ и π связей в этих молекулах?
- 69. Какие типы химической связи имеют место в соединениях FeNH4(SO4)2 и Cu2(OH)2CO3? От-вет мотивировать.
- 70. Какие характеристики используют для оценки ковалентной связи? Привести примеры.
- 71. Написать структурные формулы HNO3, H2SO3, KMnO4. Указать степени окисленности эле-ментов в этих соединениях и охарактеризовать типы химических связей в этих молекулах.
- 72. Как происходит возбуждение электронов и гибридизация электронных орбиталей? Виды гибридизации. Привести примеры.
- 73. Как образуется ионная связь? Какие элементы способны ее образовывать? Привести приме-ры.
- 74. В чем особенности донорно-акцепторной связи? Объяснить их на примере образования ка-тиона NH4+.
- 75. Как образуется химическая связь в кристаллах металлов? Как зависят важнейшие физиче-ские свойства металлов от особенностей металлической связи?
- 76. Дать характеристику водородной связи. Как влияет образование димеров воды (H2O)2 на ее физические свойства?
- 77. Какие типы химической связи имеют место в молекулах NH3, CO2, Cl2? Изобразить геомет-рическое строение молекул и схемы перекрывания электронных облаков.
- 78. Указать типы химической связи в молекулах CH4, O2, HCN. Привести схемы перекрывания электронных облаков.
- 79. Изобразить электронными уравнениями процессы образования молекул КСl, Na2O, Al2O3. Какой тип химической связи имеет место в этих соединениях?
- 80. Что такое относительная электроотрицательность элемента и как она влияет на степень по-лярности связи атомов двух элементов? Какая из молекул HF, HCl, HBr и HI наиболее полярна?
- 81. Оксид железа (III) может быть восстановлен различными восстановителями при 298 К:
- a) Fe2O3 (κ) + 3H2 (Γ) = 2Fe (κ) + 3H2O (Γ)
- б) Fe2O3 (к) + 3C (графит) = 2Fe (к) + 3CO (г)
- B) Fe2O3 (κ) + 3CO (Γ) = 2Fe (κ) + 3CO2 (Γ)

Определить изменение энтальпии ΔH° в каждой из этих реакций.

- 82. Вычислить значение ΔH° для протекающих в живых организмах реакций превращения глю-козы:
- a) C6H12O6 (κ) = 2C2H5OH (κ) + 2CO2 (Γ)
- б) C6H12O6 (к) + 6O2 (г) = 6CO2 (г) + 6H2O (ж)

Какая из этих реакций дает организму больше энергии?

83. Тепловой эффект реакции гашения извести

 $CaO(\kappa) + H2O(\kappa) = Ca(OH)2(\kappa)$

равен 65,3 кДж. Сколько теплоты выде-лится при гашении 100 кг негашеной извести водой?

84. Восстановление диоксида свинца водородом протекает по уравнению:

 $PbO2 (\kappa) + H2 (\Gamma) = PbO (\kappa) + H2O (\Gamma) - 182,8 кДж$

Определить стандартную теплоту образования РьО2.

- 85. Сколько теплоты выделится при окислении 1 м3 аммиака, измеренного при нормальных условиях, по реакции: $4NH3 (\Gamma) + 5O2 (\Gamma) = 4NO (\Gamma) + 6H2O (\Gamma)$, $\Delta H^{\circ} = -904,8$ кДж
- 86. Водяной газ представляет собой смесь равных объемов водорода и оксида углерода (II). Найти количество теплоты, выделяющейся при сжигании 1 м3 водяного газа (до CO2 и H2O), измеренного при нормальных условиях.
- 87. Вычислить, сколько теплоты выделится при обжиге 1 кг сульфида цинка по реакции:
- 2ZnS(κ) + 3O2(Γ) = 2ZnO(κ) + 2SO2(Γ), ΔH° = -943,6 κДж
- 88. Определить стандартную энтальпию (ΔН°) образования РН3, исходя из уравнения:
- 2PH3 (г) + 4O2 (г) = P2O5 (к) + 3H2O (ж), $\Delta H^{\circ} = -2360 \text{ кДж}$
- 89. Исходя из теплового эффекта реакции
- 3CaO (к) + P2O5 (к) = Ca3(PO4)2 (к), $\Delta H^{\circ} = -739 \text{ кДж}$

определить ΔH° образования ортофос-фата кальция. Сожжены с образованием Н2О (г) равные объемы водорода и ацетилена С2Н2, взятых при одинаковых условиях. В каком случае выделится больше теплоты? Во сколько раз? Что такое энтропия и в каких единицах она выражается? Как изменяется энтропия с возрастанием температуры и при фазовых переходах? Что такое изобарно-изотермический потенциал (энергия Гиббса)? Как определяется изменение энергии Гиббса в результате химической реакции и как оно влияет на направленность реакции? Рассчитать изменение энергии Гиббса в реакциях: a) $2\text{Fe}(\kappa) + \text{Al2O3}(\kappa) = 2\text{Al}(\kappa) + \text{Fe2O3}(\kappa)$, б) 2A1 (к) + Fe2O3 (к) = 2Fe (к) + A12O3 (к)и указать, какая реакция способна про-текать самопроизвольно. Вычислить системы PbO2 + Pb = 2PbO на основании и реагирую-щих веществ и определить, возможна ли эта 94 реакция. Вычислить ΔG° и ΔS° реакции NH4Cl (κ) + NaOH (κ) = NaCl (κ) + H2O (Γ) + NH3 (Γ). Можно ли использовать эту реакцию для получения аммиака при стандартных условиях? Вычислить значения следующих реакций восстановления оксида железа (II): а) FeO (к) + $\frac{1}{2}$ C (графит) = Fe (к) + $\frac{1}{2}$ CO2 (г) б) $FeO(\kappa) + C(графит) = Fe(\kappa) + CO(г)$ B) FeO (K) + CO (Γ) = Fe (K) + CO2 (Γ) Протекание какой из этих реакций наиболее вероятно? Рассчитать значения следующих реакций и установить, в каком направлении они могут протекать самопроизвольно в стандартных условиях при 25 °C: а) $Pb(\kappa) + CO(\Gamma) = PbO(\kappa) + C(\Gamma paфит)$ 6) $8A1 (\kappa) + 3Fe3O4 (\kappa) = 9Fe (\kappa) + 4A12O3 (\kappa)$ B) CaCO3 (K) = CaO (K) + CO2 (Γ) Какие из перечисленных оксидов могут быть восстановлены водородом до свободного ме-талла при 298 К: СаО, FeO, CuO, PbO, Fe2O3? Какие из перечисленных оксидов могут быть восстановлены до свободного металла алюми-нием при 298 К: СаО, FeO, CuO, PbO, Fe2O3? Определить систем: a) H2 (Γ) + S (κ) = H2S (Γ), б) 2C (графит) + H2 (г) = C2H2 (г), в) 2C (графит) + 3H2 (г) = C2H6 (г) Чем измеряется скорость химической реакции и от каких факторов она зависит? 101 Рассчитать величину константы скорости реакции А + В = АВ, если при концентрациях ве-ществ А и В, равных 102. соответственно 0,03 и 0,02 моль/л, скорость реакции равна 6•10-5 моль/(л•мин). Во сколько раз следует увеличить концентрацию вещества В в системе $2A2 (\Gamma) + B2 (\Gamma) = 2A2B (\Gamma),$ чтобы при уменьшении концентрации вещества А в 4 раза скорость прямой реакции не измени-лась? Реакция между веществами А и В протекает по уравнению 2А + В = А2В. Концентрация ве-щества А равна 6 моль/л, вещества B-5 моль/л. Константа скорости реакции равна 0,5. Вычис-лить скорость химической реакции в начальный момент времени и в тот момент, когда в реак-ционной смеси останется 50 % вещества В. В каком направлении сместится равновесие реакции: $3H2 (\Gamma) + N2 (\Gamma) \square 2NH3 (\Gamma)$ при уменьшении объема в системе в два раза? Реакция протекает по уравнению Na2S2O3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2SO3 + S(T)Как изменится скорость реакции после разбавления реагирующей смеси в 4 раза? 107. Как изменится скорость прямой реакции 2SO2 (г) + O2 (г) 🗆 2SO3 (г), если дав-ление в системе увеличить в 4 раза? Две реакции при температуре 20 °C протекают с одинаковой скоростью. Температурный ко-эффициент скорости первой реакции равен 2, второй 3. Как будут относиться между собой ско-рости реакций, если их провести при 60 °C? 109. Определить температурный коэффициент скорости реакции, если при понижении темпера-туры на 50 °C реакция замедляется в 32 раза. Реакция протекает по уравнению: $4HC1(\Gamma) + O2(\Gamma) \square 2H2O(\Gamma) + 2C12(\Gamma);$ Какими изменениями давления, температуры и концентраций реагирующих веществ можно сме-стить ее равновесие вправо? 111. Какое состояние системы называется химическим равновесием? Перечислить признаки ис-тинного химического равновесия. 112. Что такое константа химического равновесия? Написать выражения констант равновесия реакций: 2NO (Γ) + O2 (Γ) \square 2NO2 (Γ); MgCO3 (T) \square MgO (T) + CO2 (Γ); FeO(T) +CO (Γ) \square Fe (τ) + CO2 (Γ). 113. Как повлияет повышение температуры и давления на равновесие следующих обратимых реакций: N2O4 (Γ) \square 2NO2 (Γ), = +184,6 кДж 2CO (Γ) \square CO2 (Γ) + C (T), = -172.5 кДж

 $CO(\Gamma) + H2O(\Gamma) \square CO2(\Gamma) + H2(\Gamma), = -41.2 кДж$

1.14. Как пантнает пъвъвшения температуры и даксения на равновсене следующих обратимых реакций: (с) + 202 (с) 1 2012 (с) 1 2012 (с) 1 4.35 (с) 1 201 (с) 1 2012 (с) 1 4.35 (с) 1 201 (с) 1 2012 (с	УП: 2025_35.03.10_z.plx	стр. 11
 С (т) + CO2 (т) □ 2CO (г). − 1472.5 «Дас № 12 (г) + O2 (г) □ 2NO (г). − 180 «Дас № 190 «Дас №	114 Как порлидет портинение температуры и парпения на рариоресие следующих обратимых реакций:	
2 H2 (г) + О2 (г) □ ZNO (г). = 4.83,6 кДк 18 (с) − О2 (г) □ ZNO (г). = 180 кДк 1		
115. В важих на приведенних ниже реалицій измененне двяжения не назовет емещения равновесня и почему? 2NO (г) + O2 (г) □ 2NO (г) 2CO (г) + D2 (г) □ 2NO (г) 2CO (г) + D2 (г) □ 2NO (г) 116. Написать выражения констант равновесня следующих обратимых химических реакций: 4Fe (г) + 4RD (г) □ E3O (г) □ E3O (г) + 4RD (г) 117. Указать, казовам изменениями температуры, дваления и концентраций реагирующих веществ можно добиться максимального изжод цаммина по реаспоит: N2 (г) + 3RD (г) □ 2ND (г) 117. Указать, казовам изменениями температуры, дваления и концентраций реагирующих веществ можно добиться максимального изжод цаммина по реаспоит: N2 (г) + 3RD (г) □ 2ND (г) 118. Реавиры протевает по уравнению: 2SO (г) □ 2CO (г) 119. На оспования пранципал 1-е Пательсе определите, в каком папрактенни сместится равновесне в системах: о) при поможения честиратуры указачения разлениям можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 19. PCIS (г) □ PCIS (г) 19. О3 (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 20. CA (г) □ CD (г) 20. Какими изменениями температуры и дваления можно сместить равновесне в сторону про-дуктов разложения? 21. Саспам температуры про-дуктов разложения про-дуктов разложения про-ду		
115. В каких из привиденных виже реакций изменение двяления не вызовет емещения равновесия и почему? 200 (т) + 20 (т) = 200 (т) 116. Напасать выражения констант равновесия съсдующих обратимых химических реакций: 4Fe (т) + 44120 (т) = 16 (304 (т) + 4412 (т) (т) = 200 (т) = 200 (т) 410 (т) = 20 (т) = 200 (т) 410 (т) = 200 (т) = 200 (т) 41		
N2 (g) + 02 (g) ≡ 200 (g) CO (g) + 120 (g) ≡ 120 (g) CO (g) + 120 (g) ≡ 120 (g) H16 (Hameart вырожения констант равновесия следующих обративых химических реакций: 4Fe (g) + 4E20 (g) ≡ 120 (g) 4Fe (g) + 4E20 (g) ≡ 200 (g) 4Fe (g) + 2C1 (g) ≡ 200 (g) 4Fe (g) + 2C1 (g) ≡ 200 (g) 4Fe (g) ± 2C1 (g) 4Fe (g) ± 2C1 (g) ≡ 2C1 (g) 4Fe (g) □ 2C1 (g) □ 2C1 (g) □ 2C1 (g) 4Fe (g) □ 2		
2CO (1) + 12C (1) = 12CO (1) 116. Написать выражения конставт равновесия следующих обратимых химических реанций: 4fe (1) + 4H2 (2) □ Fe3Ad (1) + 4H2 (2) (1) □ Fe3Ad (1) □ Fe3Ad (1) + 4H2 (2) (1) □ Fe3Ad (1) □ Fe3Ad (1) + 4H2 (2) (1) □ ZCO (1) 117. Указать, кажим измененизам температуры, давления и концентраций реагирующих веществ можно добиться максимального выхова амилика по реанции: 118. Реамана портесвете по уравнению: 2SO 2 (7) □ ZCO (7) □ ZSO 3 (7), = -284.2 кДж. 118. Реамана портесвете по уравнению: 2SO 2 (7) □ OZ (7) □ ZSO 3 (7), = -284.2 кДж. 118. Наменением камих парометерова кожно добиться смещения равновесия в сторопу образования ок-сида серы (VI)? 119. На сповании припципа Ib-Шагелес оврежените, в каком направлении сместится равновесие в системах: а) при полижении температуры, б) при увеличении давления: 2SO 2 (7) □ C 12 (7) □ C 13 (7) (7) (8) (8) (9) (8) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10		
 (СО (г) + H2O (г) □ H2 (г) + CO2 (г) 116. Наившель выражения конствит равновесия следующих обратимых химических реакций: 4Fc (г) + 4H2O (г) ∪ EO (г) 120 (г) + 2C0 (г) 2410 (г) + 2C1 (г) 2411 (г) + O2 (г) □ 2P12 (г) + 2C12 (г) 1417. Уъзгатъть, камеми темнератирум, давления и концентраций реагирующих веществ можно добиться максивального выхода амминака по реакции: — = -92,4 кДж. 118. Реакция протекает по уравлению: — -2842 кДж. 118. Реакция протекает по уравлению: — 2842 кДж. 119. На своюмани цриниципа Л-НПательса определите, в каком направлении съсствите равновесие в системах: а) при полижении температуры: б) при узеличении давлению: — 0 119. На своюмани цриниципа Л-НПательса определите, в каком направлении съсствите равновесие в системах: а) при полижении температуры: б) при узеличении давлению: — 0 120. Какоми изъмненимы температуры и давлению: — 0 121. РСЗ (г) = CH30 (г): — 178 кДж. 23. Са (са): — (са): — 178 кДж. 24. Са (са): — 179 (г): — 179 кДж. 25. Са (са): — 179 (г): — 179 кДж. 26. Са (са): — 179 (г): — 179 кДж. 27. Чему равла массовая доля NаC1 в растворе, содержащем з моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 27. Са (са): — 179 (г): — 179 (г): — 20 кДж. 28. По (са): — 179 (г): —	$N2(r) + O2(r) \square 2NO(r)$	
116. Написать выражения констант равновесня следующих обратимых химических реакций: 4Fe (г) +4H2 (г) − 12CO (г) − 14FC (г) + 4H2 (г) − 12CO (г) − 14FC (г) − 12FC	$2CO(r) + O2(r) \square 2CO2(r)$	
4Fe (г) + 4H2O (г) □ Fe2O4 (г) + 2H2 (г) (Ст) + CO2 (г) □ ZCO (г) (П) + CO2 (г) □ ZCO (г) (П) + CO2 (г) □ ZCO (г) (П) + CO2 (г) (П) − CO2 (г) (П) □ ZNH3 (
 С (т) ÷ CO2 (т) ≅ CO2 (т) 2 (т) ⊆ CO2 (т) 2 (т) ∈ CO2 (т) 2 (т) ∈ CO2 (т) 2 (т) 3 (т) 4 (т) 		
4HCI (1) + О2 (1) □ 2H2O (1) + 2CI2 (1) 11.7. Указать, какими изменениями температуры, давления и концентраций реагирующих веществ можно добиться максимального выхода аммнажа по реакцип: № (1) + 3H2 (7) □ 2M13 (7) □ − 29.4 кДж. 11.8. Ревация протекает по уравненню: ≥ 2842 кДж. 11.9. На оснований принципа Ле-Пагелье определите, в каком направлении констится равновесие в системах: а) при поизкиении температуры; б) при увеличении далления: а) CO (7) + 2B2 (7) □ CH3OH (7); < 0 6) PCIS (7) □ CH3OH (7); < 0 6) PCIS (7) □ CH3OH (7); < 0 7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (
117. Укланъ, каязым изменениями температуры, давления и концентраций реагирующих веществ можно добиться макканального выхода яммикая по реакции: 12 (г) + 3142 (г) □ 2 N143 (г), = -92,4 кДж. 118. Реакция протекает по уравнению: 28O2 (г) + O2 (г) □ 28O3 (г), = -284,2 кДж. Изменением маких параметров можно лобиться смещения равновесия в сторону образования ок-сида серы (VI)? 119. На основании принципа Ле-Шательс определите, в каком направлении сместитея равновесие в системах: а) при нонижении температуры; б) при увеличения давления: а) СО (г) + 212 (г) □ CH30 (г) + C12 (г); < 0 б) PC15 (г) □ PC13 (г) + C12 (г);		
максимального выхода аммивая по реакции: N2 (г) 3 H3 (г) 2 N18 (г) 2 N18 (г), = -92.4 кДж. 118. Реамция протоклет по уравнению: 2802 (г) + O2 (г) 2803 (г), = -284.2 кДж. 119. На основании принципа Лс-Шагелье определите, в каком направлении еместител равновесие в системах: а) при понижении температуры; б) јир узеспичени давления: a) CO (г) + 212 (г) CH30H (г); < 0 6) PC15 (г) + C12 (г); < 0 7) PC15 (г) + C12 (г); < 0 7) PC15 (г) + C12 (г); < 0 8) PC15 (г) + C12 (г); < 0 120. Какими изменениями температуры и далаления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СаСО (к) - C20 (г); - 178 кДж 6) 2N18 (г) СаО (к) + C02 (г); - 178 кДж 6) 2N18 (г) СаО (к)		
№ 2 (г) = 2 № 13 (г) 2 № 13 (г) 2 № 3 (г) 2 − 92.4 кДж.	1 11	R
118. Реакция протекает по уравнению: 2502 (р) + Q 20 (г) □ 2503 (г), = −284.2 кДж. Изменением выях нараметров можно добиться смещения равновесия в сторону образования ок-сида серы (VI)? 119. На основании принипиа Д-ИПателье оперидените, в каком направлении сместится равновесие в системах: а) при понижении температуры; б) при увеличения давления: а) СО (г) + 2142 (г) □ CH3OH (г); < 0 6) PCIS (г) = PCIS (г) + CI2 (г); < 0 120. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СО (г) + 2162 (г); < 20 120. Какими изменениями температуры и давления об сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СОС (г); −1 3H2 (г);		
2SO2 (г) + O2 (г) □ 2SO3 (г). — -284.2 кДж. Наменением кавых нараметром можено робиться емещения равновесия в сторону образования ок-сида серы (VI)? 119. На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится равновесие в системах: а) при понижении температуры; б) пру ведачении двязения: « 0 6) PCI5 (г) □ PCI3 (г) + CI2 (г); 70. (с) + 2PCI3 (г) + CI2 (г); 8) С (о + 2PCI3 (г) + CI2 (г); 8) С (о + 2PCI3 (г) + CI2 (г); 8) С (о + 2PCI3 (г) + CI2 (г); 9. (с) 6) PCI5 (г) □ PCI3 (г) + CI2 (г); 10. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СасО3 (к) □ CaO (к) + CO2 (г); 110. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СасО3 (к) □ CaO (к) + CO2 (г); 112. Сменали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 112. Сменали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 112. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотиость 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворана доль и раствора нитрата магния м(в(N3)2; 6) 0,1 н. раствора фофорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида мамония NHOH? 112. В 15 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г раствора фофорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида мамония NHOH? 123. В 15 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г раствора фофорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора НЗРО4; в му равна максем образующегося осадва сульфата бария ВабО4? 124. Колько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? 125. В 15 л 0,125 н. раствора Ск. (с) 0,5 п. раствора КП2 н. раствора КП2 н. раствора НВС3 н. раствора НВС3 н. раствора НВС3 н. раствора Ск. (с) 0,5 п. раствора Ск.		
Изменением ваних нараметром можно добиться смещения равновесия в сторону образования ок-сида серы (VI)? 19. На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится равновесие в системах: а) при понижении температуры; б) при увеличении давления: а) СО (0) + 2 HZ (1) □ CH3OH (1); < 0 70. РСІЗ (г) + CO2 (г); < 0 71. СО (Б) РСІЗ (г) + CO2 (г); < 0 71. СО (Б) РСІЗ (г) + CO2 (г);		
119. На основании принципа Ле-Шателье определите, в каком направлении сместится равновесие в системах: а) при поинжении температуры (5) при уреличении давления: а) СО (г) + 2H2 (г) □ CH3OH (г); < 0 6) PCIS (г) □ PCI3 (г) + CI2 (г); > 0 7. СКакими изменениями температуры (г) × 20 8. СКакими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СаСО3 (к) □ CaO (к) + CO2 (г); − 178 к/дж 6) 2NH3 (г) □ № (г) + 3H2 (г); = 220 к/дж. 121. Чему равна массовая доля NaC1 в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 122. Смещали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора серной кислоты (плотность 1070 кл/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальния? 123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кл/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальния? 124. Сколько праммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; 6) 0,1 н. раствора фофорной кислоты Н3РО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 15 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна можарность: а) 6 н. раствора НХО3 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна можарность: а) 6 н. раствора НХО3 илотностью 1055 кг/м3. Сколько праммов НХО3 содержится в 2 лятого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора НХО3 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля НХСО4 но траствора? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора N2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность 16 %-ного раствора НТ плотностью 1057 кг/м3? 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора НТ плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько илитров 24 %-ного раств		
а Со (г) + Р42 (г) □ CH30H (г); < 0 6) PCI5 (г) □ PCI3 (г) + CI2 (г); < 0 6) PCI5 (г) □ PCI3 (г) + CI2 (г); < 0 7) □ PCI3 (г) + CI2 (г); < 1 8) □ PCI3 (г) + SH2 (г); < 2 9) □ PCI3 (г) + SH2 (г); < 2 9) □ PCI3 (г) + SH2 (г); < 2 121. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 128. 129. 129. 120. 120. 120. 120. 121. 121. 121. 122. 122. 123. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 128. 128. 129. 129. 129. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 121. 121. 122. 123. 124. 124. 125. 126. 126. 127. 127. 128. 129. 129. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 120. 121. 122. 123. 124. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 129. 120. <		ппи
а) СО (т) + 2H2 (т) ☐ CH3OH (т); < 0 6) PCI5 (т) □ PCI3 (г) + CI2 (т); > 0 120. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СаСОЗ (к) □ CO (к) + CO2 (т); = 178 к/дж 6) 2NH3 (т) □ N2 (т) + 3H2 (т); = 220 к/дж. 121. Чему равна массовая доля NaCI в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 122. Смещалк 50 7 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 123. Какой объем 20 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидрокеида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе. 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность по може раствора КОН (плотностью 1055 кг/м3). Сколько платров 24 %-ного раствора KOH (плотностью 1018 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л. 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1057 кг/м3?) 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора КОН (плотностью 110 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора, содержаниета 3 л 21 %-ного раствора (спотностью 1216 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора. 133. Ка		PII
 6) PCIS (т) □ PCIS (т) ± CI2 (г); > 0 120. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) CaCO3 (к) □ CaO (к) + CO2 (г); = 178 кДж 6) 2NH3 (т) □ N2 (т) + 3H2 (т); = 220 кДж. 6) 2NH3 (т) □ N2 (т) + 3H2 (т); = 220 кДж. 6) 2NH3 (т) □ N2 (т) + 3H2 (т); = 220 кДж. 6) 2NH3 (т) □ N2 (т) + 3H2 (т); = 220 кДж. 121. Чему равна массовая доля NaCl в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 122. Смещали 50 г 30 %—ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %—ного раствора. 123. Какой объем 20 %—ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %—ного раствора. 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: 125. Какой объем 20 %—ного раствора ненества содержится в 200 мл: 126. Сколько праммов растворенного вещества. Найти его эквивалент—ную массу. 127. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент—ную массу. 128. В 1,5 л 0,125 н. раствора Содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент—ную массу. 129. Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КС1; б) 0,5 н. раствора АС13; в) 1 н. раствора Н2SO4? 128. Вычисилть колярность: а) 6 н. раствора КС2 б) об 5 к удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля Н2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля Н2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля Н2SO4 в оставшемся раствора. 129. Из 400 г 40 %—ного (по массе) раствора Н2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля Н2SO4 в оставшемся раствора. 131. Чему равна нормальность и молярность 16 %—ного раствора НП плотностью 180 кг/м3. 132. Сколько илирия 24 %—ного раствора КОН (плотностью 180 кг/м3), необходимого для з		
120. Какими изменениями температуры и давления можно сместить равновесие в сторону про-дуктов разложения? а) СаСОЗ (к) — 20 кДж. 6) 2NH3 (г) — № (г) + 3H2 (г); — 220 кДж. 121. Чему равна массовая доля NaCl в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 122. Смещали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Mg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 128. Вычислить молярность: 30 е. праствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля 128. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1055 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность в 1310 кг/м3). 130. Плотность 15 %-ного (по массе) раствора КОН (плотностью 1070 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных акумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1070 кг/м3), потребуется для нейтрализации раствора, содержанието 32 г NaOH? 133. Сколько литров 24 %-ного (по массе) серной кислоты (плотностью 1840 кг/м3), отребуется для нейтрализации раствора, содержанието 32 г NaOH? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) осрной кис		
6) 2МН3 (г) □ № 2 (г) + 3H2 (г); = 220 кДж. Чему равна массовая доля NaCl в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 122. Смешали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Mg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония № 140H? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КСl; б) 0,5 н. раствора АlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора KCl; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массаобразующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 129. Из 400 г 40 %-ного по массе раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся раствора? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность враствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора KOH (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для заливь-ки щелочных аккумуляторов, можно притоговить из 10 л. 48 %-ного раствора КОH (плотностью 1510 кг/м3). 133. Сколько милилилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, осержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько милилилитров 96 %-ного (по массе) раствора оргофосфорной кислоты		1 ?
122. Чему равна массовая доля NaCl в растворе, содержащем 3 моль хлорида натрия в 2 кг рас-твора? 123. Какой объем 20 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора. 124. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 гкальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Mg(NO3)2; 6) 0,1 и. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 и. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 и. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 и. раствора ВаС12? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 и. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 и. раствора BaC12? Чему равна молярность: а) 6 и. раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 воставщемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярньость раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HP плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора (Плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотностью 11810 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержащего 32 г NaOH? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1840 кг/м3), потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. раствора NoOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 66 %-ного раствора (Плотность 1840 кг/м3) потребуется для нейтра	a) CaCO3 (к) □ CaO (к) + CO2 (г); = 178 кДж	
122. Смещали 50 г 30 %-ного раствора некоторого вещества и 140 г его 45 %-ного раствора. Вы-числить массовую долю полученного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальшия? 123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальшия? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NI4OH? 125. В 15, л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSО4? 127. Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSО4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора КС1; б) 0,5 н. раствора AlC13; в) 1 н. раствора H2SO4? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько миллелитров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных акжумуляторов, можно приготовить из 10 л. 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1840 кг/м3), содержа-пей 9 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты плотностью 1840 кг/м3) потребуется для нейгрализации раствора, содержащете в 3 л 21 %-ного раствора (плотность 1970 кг/м3) потребуется для нейгрализации раствора, содержащете 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96	$ 6 \rangle 2 \text{NH3 (r)} 1 \rangle \text{NH2 (r)}; = 220 кДж.$	
долю полученного раствора. 123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 гальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; 6) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для язаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна масса образующетося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КС1; б) 0,5 н. раствора AlC13; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько плитров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л. 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1510 кг/м3). 133. Сколько молилилгров конинентрированной серной кислоты плотностью 1810 кг/м3? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько милилилгров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для притотовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ротофосфорной кислоты Плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды ссрержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды ссрержится в 1 л эт		
123. Какой объем 20 %-ного раствора серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) необходим для пол-ного растворения 20 г кальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты Н3РО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора Н2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаС12? Чему равна масса образующегося осадка сульфата барня ВаSО4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КС1; б) 0,5 н. раствора AlC13; в) 1 н. раствора Н2SO4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора КС1; б) 0,5 н. раствора AlC13; в) 1 н. раствора HPSO4? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Потность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных акумуляторов, можно приготовить из 10 л. 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, сарержащей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного акумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотностью 1840 кг/м3) потребуется для нейтрализащии раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора Расофорной кислоты Н3РО4 (плотность 1216 кг/м3)		/Ю
г кальция? 124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; 6) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария BaSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КСС; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность: 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 4 8 %-ного раствора КОН (плотностью 1840 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько мольпилитров 96 %-ного (по массе) раствора Раствора ротофосфорной кислоты НЗРО4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ротофосфорной кислоты НЗРО4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого рас		• •
124. Сколько граммов растворенного вещества содержится в 200 мл: а) 0,5 М раствора нитрата магния Мg(NO3)2; б) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты H3PO4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфарта бария BaSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора KCl; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность: а) 6 н. раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумуляторов? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вачислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды годержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCI, изм		ия 20
а) 0,5 М раствора нитрата магния мид (NO3)2; 6) 0,1 н. раствора фосфорной кислоты НЗРО4; в) 0,02 М раствора гидроксида аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора ВаСl2? Чему равна масса образующегоса осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна масса образующегоса осадка сульфата бария ВаSO4? 128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора КСl 6) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярныесть раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных закумуляторов, можно притотовить из 10 л 4 %-ного раствора КОН (плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для притотовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора NaOH (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа		
аммония NH4OH? 125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария BaSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора KCl; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л. 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1840 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужию взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (Ш) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1442 кг/м3? 139. В какой массе воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/		.0
125. В 1,5 л 0,125 н. раствора содержится 13,91 г растворенного вещества. Найти его эквивалент-ную массу. 126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария ВаSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора KCl; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора KOH (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно принотовить из 10 л. 48 %-ного раствора KOH (плотно-стью 1510 кг/м3). Сколько миллилитров конщентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо растворить 67,2 л		а
126. Сколько миллилитров 0,1 н. раствора H2SO4 потребуется для взаимодействия с 200 мл 0,5 н. раствора BaCl2? Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария BaSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КСl; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность: 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для притотовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе		
Чему равна масса образующегося осадка сульфата бария BaSO4? 127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КСІ; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4? 128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора HNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов HNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотнос-тью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		2?
128. Вычислить молярность 10 %-ного раствора НNO3 плотностью 1055 кг/м3. Сколько граммов НNO3 содержится в 2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NаOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора. 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCI, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) растворо? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
2 л этого раствора? 129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1510 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NаOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (Ш) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?	127. Чему равна молярность: а) 6 н. раствора КСІ; б) 0,5 н. раствора AlCl3; в) 1 н. раствора H2SO4?	
129. Из 400 г 40 %-ного (по массе) раствора H2SO4 выпариванием удалили 50 г воды. Чему равна массовая доля H2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, молярность, молярность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотностью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) роствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор:		гся в
Н2SO4 в оставшемся растворе? 130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора НF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько за) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
130. Плотность 15 %-ного по массе раствора Na2SO3 равна 1105 кг/м3. Вычислить нормальность, молярность, моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора HF плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (Ш) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		[
моляльность раствора. 131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора НГ плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NаOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
131. Чему равны нормальность и молярность 16 %-ного раствора НГ плотностью 1057 кг/м3? 132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты Н3РО4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа НСl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
132. Сколько литров 24 %-ного раствора КОН (плотностью 1218 кг/м3), необходимого для залив-ки щелочных аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
аккумуляторов, можно приготовить из 10 л 48 %-ного раствора КОН (плотно-стью 1510 кг/м3). 133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора Н2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребуется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты Н3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа НСl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
133. Сколько миллилитров концентрированной серной кислоты плотностью 1840 кг/м3, содержа-щей 96 % H2SO4, нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
нужно взять для приготовления 3 л 21 %-ного раствора (плотностью 1260 кг/м3), необходимого для заливки кислотного аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		1
аккумулятора? 134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		٦,
134. Какой объем 10 %-ной (по массе) серной кислоты (плотность 1070 кг/м3) потребуется для нейтрализации раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
раствора, содержащего 32 г NaOH? 135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
135. Вычислить массовую долю гидроксида натрия в 9,28 н. растворе NaOH (плотность 1310 кг/м3). 136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
приготовления 2 л 0,1 н. раствора? 137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
137. Чему равны нормальность и молярность 35 %-ного раствора ортофосфорной кислоты H3PO4 (плотность 1216 кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?	136. Сколько миллилитров 96 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1840 кг/м3) потребу-ется для	
кг/м3)? Сколько воды содержится в 1 л этого раствора? 138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?	приготовления 2 л 0,1 н. раствора?	
138. Сколько: а) граммов; б) молей хлорида железа (III) FeCl3 содержится в 3 л 25 %-ного раство-ра с плотностью 1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		6
1342 кг/м3? 139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		
139. В какой массе воды надо растворить 67,2 л газа HCl, измеренного при нормальных условиях, чтобы получить 10 %-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		Ю
%-ный (по массе) раствор соляной кислоты? 140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		1.0
140. Какой объем воды надо прибавить к 100 мл 20 %-ного (по массе) раствора H2SO4 (плотность 1140 кг/м3), чтобы получить 5%-ный раствор?		гь 10
получить 5%-ный раствор?		mo5
		тооы
	141. Вычислить осмотическое давление раствора, содержащего в 1,4 л 63 г глюкозы С6Н12О6 при 0 °C.	

содержится в 1 л раствора? 144. При какой температуре осмотическое давление раствора, содержащего 18,6 г анилина С6Н5NH2 в 3 л раствора,

При 0 °C осмотическое давление раствора сахара C12H22O11 равно 3,55•105 Па. Сколько граммов сахара

Найти осмотическое давление раствора, содержащего в 2 л 18,4 г глицерина СЗН8О3, при 27 °C.

142.

143.

VII: 2025 35.03.10 z.plx crp. 12

достигнет 2,84•105 Па?

- 145. Рассчитать молекулярную массу неэлектролита, если в 5 л раствора содержится 2,5 г неэлек-тролита, а осмотическое давление этого раствора при 20 °C равно 0,32•105 Па.
- 146. Рассчитать осмотическое давление раствора неэлектролита, содержащего $1,52 \cdot 1023$ молекул его в 0,5 л раствора при: a) 0 °C; б) 27 °C.
- 147. Вычислить давление водяного пара над 10 %-ным раствором карбамида CO(NH2)2 в воде при температуре 100 $^{\circ}$ C
- 148. Вычислить молекулярную массу глюкозы, если давление водяного пара над раствором 27 г глюкозы в 108 г воды при 100 °C равно 98775,3 Па.
- 149. Давление пара воды при 30 °C составляет 4245,2 Па. Сколько граммов сахара C12H22O11 сле-дует растворить в 900 г воды для получения раствора, давление которого на 33,3 Па ниже дав-ления пара воды? Вычислить массовую долю сахара в этом растворе.
- 150. Давление пара при 10 °C составляет 1227,8 Па. В каком количестве воды следует растворить 16 г метилового спирта СН3ОН для получения раствора, давление пара которого составляет 1200 Па при той же температуре? Вычислить массовую долю СН3ОН в этом растворе.
- 151. Давление пара раствора, содержащего 155 г анилина С6Н5NH2 в 201 г эфира при некоторой температуре равно 42900 Па. Давление пара эфира при этой температуре равно 86380 Па. Рас-считать молекулярную массу эфира.
- 152. Сколько граммов нафталина C10H8 растворено в 2 кг бензола, если этот раствор кристаллизуется при 3,45 °C? Температура кристаллизации чистого бензола 5,40 °C, а его криоскопическая константа K = 5,1 °C.
- 153. Определить молекулярную массу камфоры, если раствор, содержащий 0,552 г ее в 17 г эфи-ра, кипит при температуре на 0,461 °C выше, чем чистый эфир. Эбуллископическая константа эфира равна 2,16 °C.
- 154. Сколько этиленгликоля C2H4(OH)2 необходимо добавить к 5 л воды, чтобы получить анти-фриз, замерзающий при -15 °C? Криоскопическая константа воды K = 1,86 °C.
- 155. Вычислить криоскопическую константу воды, зная, что 11 %-ный водный раствор этилового спирта С2Н5ОН кристаллизуется при -5 °C.
- 156. Вычислить температуру кристаллизации раствора, содержащего 20 г сахара C12H22O11 в 400 г воды. Криоскопическая константа воды K = 1.86 °C.
- 157. Раствор, состоящий из 9,2 г йода и 100 г метилового спирта закипает при 65,0 °C, а чистый спирт при 64,7 °C. Эбуллиоскопическая константа спирта E = 0.84 °C. Из скольких атомов состоит молекула растворенного йода?
- 158. При какой приблизительно температуре будет кипеть и кристаллизоваться 40%-ный раствор этилового спирта C2H5OH в воде? Эбуллиоскопическая константа воды E = 0.52, а криоскопическая K = 1.86%.
- 159. Какова температура кипения раствора неэлектролита, содержащего $3,01 \cdot 1023$ молекул в лит-ре воды? Эбуллиоскопическая константа воды E = 0,52 °C.
- 160. На сколько градусов повысится температура кипения воды, если в 300 г воды растворить 27 г глюкозы С6Н12О6? Эбуллиоскопическая константа воды $E = 0.52 \, ^{\circ} C$.
- 161. Определить рН и рОН раствора, содержащего 6,75•10-10 моль/л ОН-.
- 162. Найти степень диссоциации сероводородной кислоты по первой ступени в 0,1 M растворе, если константа диссоциации для этой ступени равна 1,1•10-7.
- 163. Чему равны концентрации ионов H+ и OH^- в растворах, pH которых равен: a) 2,0; б) 7,0; в) 11,0?
- 164. Во сколько раз концентрация ионов H^+ в 1 н. растворе HNO3 ($\alpha = 82$ %) больше, чем в 1 н. растворе H2SO4 ($\alpha = 51$ %)?
- 165. Определить концентрацию ионов ОН в 0,01 М растворе гидроксида аммония NH4OH, если Кдисс = 1,77 10-5.
- 166. Константа диссоциации ортофосфорной кислоты H3PO4 по первой ступени равна 7,11•10-3. Пренебрегая диссоциацией по другим ступеням, вычислить концентрацию ионов H+ в 0,5 М растворе кислоты.
- 167. Степень диссоциации уксусной кислоты СН3СООН в 1 н., 0,1 н., 0,01 н. растворах соответ-ственно равна 0,42, 1,34, 4,25 %. Вычислить Кдисс СН3СООН для этих растворов и доказать, что константа диссоциации не зависит от концентрации раствора.
- 168. Осмотическое давление 0,2 н. раствора ZnSO4 при 0 °C равно $3,59 \cdot 105$ Па. Вычислить изото-нический коэффициент этого раствора.
- 169. Давление водяного пара над раствором 24,8 г КСl в 100 г H2O при 100 °C равно 9,14•104 Па. Вычислить изотонический коэффициент, если давление водяного пара при этой температуре равно 1,0133•105 Па.
- 170. Раствор, содержащий 8 г NaOH в 1000 г H2O, кипит при 100,184 °C. Определить изотониче-ский коэффициент. Эбуллиоскопическая константа воды E = 0.52 °C.
- 171. Раствор, содержащий 1,7 г хлорида цинка ZnCl2 в 250 г воды, кристаллизуется при темпера-туре -0,23 °C. Определить кажущуюся степень диссоциации ZnCl2 в этом растворе. Криоскопи-ческая константа воды K = 1,86 °C.
- 172. Водные растворы карбамида CO(NH2)2 и хлорида кальция CaCl2, содержащие в одинаковых массах растворителя соответственно 0,5 и 0,25 моль растворенного вещества, кипят при одной и той же температуре. Найти кажущуюся степень диссоциации CaCl2 в этом растворе.
- 173. Вычислить кажущуюся степень диссоциации NaCl в 0,25 н. растворе, если этот раствор при 18 °C имеет такую же величину осмотического давления, что и 0,44 М раствор глюкозы C6H12O6.
- 174. Раствор, содержащий 0.265 г Na2CO3 в 100г воды, кристаллизуется при температуре -0.13 °C. Вычислить кажущуюся степень диссоциации Na2CO3 в этом растворе. Криоскопическая константа воды K = 1.86 °C.
- 175. Определить осмотическое давление 0,01 н. раствора сульфата магния MgSO4 при 18 °C, если кажущаяся степень диссоциации этого электролита равна 66 %.
- 176. Осмотическое давление 0,125 M раствора КВr равно 5,63•105 Па при 25 °C. Вычислить ка-жущуюся степень диссоциации КВr в этом растворе.
- 177. Вычислить кажущуюся степень диссоциации хлорида калия KCl в растворе, содержащем 4,47 г KCl в 100 г воды, если этот раствор кристаллизуется при -2 °C. Криоскопическая кон-станта воды K = 1,86 °C.

178. Давление пара раствора, содержащего 31,5 г нитрата кальция Ca(NO3)2 в 500 г воды равно 1903,5 Па при 17 °С. Давление пара воды при этой температуре равно 1937 Па. Рассчитать ка-жущуюся степень диссоциации Ca(NO3)2 в этом растворе. 179. При какой температуре будет кипеть одномоляльный раствор NaOH, если степень его диссоциации равна 73 %? Эбуллиоскопическая константа воды $E = 0.52 \, ^{\circ}C.$ Определить давление пара 0,5 %-ного водного раствора КОН при 50 °C. Давление пара воды при этой 180. температуре равно 12,334 кПа. Кажущаяся степень диссоциации КОН в этом растворе равна 87 %. Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются молекулярно-ионными уравнениями: B) $H++OH^-\rightarrow H2O$; a) $3Ca2+ + 2PO43^{-} \rightarrow Ca3(PO4)2$; 6) Ni2+ + 2OH $^ \rightarrow$ Ni(OH)2; Γ) NO2⁻ + H+ \rightarrow HNO2. Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций, протекающих при сме-шивании растворов 182. ZnSO4 и K2S; Ba(OH)2 и FeCl3; NH4HCO3 и NH4OH; NaOH и HCl. Написать в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций, приводящих к образованию осадков: a) $Hg(NO3)2 + KI \rightarrow$ B) CaCl2 + Na2CO3 → 6) AlCl3 + AgNO3 → Γ) Fe2(SO4)3 + NaOH \rightarrow Написать в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций, приводящих к образованию газов и слабых электролитов: a) Na2CO3 + H2SO4 → B) CaF2 + HC1 \rightarrow 6) NH4Cl + Ba(OH)2 → Γ) K2S + H2SO4 \rightarrow Написать в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения реакций нейтрализации: a) $Zn(OH)2 + HC1 \rightarrow$ B) CH3COOH + NH4OH \rightarrow 6) HF + KOH → Γ) H2S + NaOH \rightarrow Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются молекулярно-ионными уравнениями: 186. B) $Ba2++SO42^{-} \rightarrow BaSO4$ a) Cu2+ + S2 - CuS6) $Pb2+ + 2I^- → PbI2$ Γ) Ca2+ + CO32⁻ \rightarrow CaCO3 Составить молекулярные уравнения реакций, которые выражаются молекулярно-ионными уравнениями: 187. a) $H++F^- \rightarrow HF$ B) $CO32^- + 2H^+ \rightarrow H2O + CO2$ Γ) Ag+ + Br⁻ \rightarrow AgBr 6) $NH4++OH^- \rightarrow NH4OH$ Смешаны растворы: a) CuCl2 и Na2SO4; б) BaCl2 и K2SO4; в) KNO3 и HCl; г) AgNO3 и KCl. В каких случаях реакции пройдут практически до конца? Составить для этих реакций молекуляр-ные и молекулярно-ионные уравнения. Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций, протекающих при смешивании растворов FeSO4 и Na2S; CuCl2 и Ba(OH)2; KHCO3 и KOH; Ca(HCO3)2 и Ca(OH)2. Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций, протекающих при смешивании растворов CaOHCl и HCl; Co(NO3)2 и H2S; CuSO4 и NaOH; Na2SO3 и HCl. Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций гидролиза солей NH4Cl, Na2S, CuSO4, 191 AlCl3. Указать реакцию растворов. 192 Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций гидролиза солей CH3COONa, CuCl2, Fe2 (SO4)3, NH4CN. Указать реакцию растворов. 193 Составить молекулярные и молекулярно-ионные уравнения реакций гидролиза солей (NH4)2CO3, K2S, Na2SO3, Na3PO4. Какую реакцию обнаруживают растворы этих солей? Какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу: NH4Br, KBr, CuCl2, BaCl2, FeSO4, K2SO4, Cr (NO3)3? Для каждой из гидролизующихся солей написать уравнения реакций гидролиза в молекулярной и ионномолекулярной форме (по І ступени) и указать реакцию вод-ного раствора каждой соли. Какие из перечисленных ниже солей подвергаются гидролизу: Al(NO3)3, KNO3, KCN, Cr2S3, CH3COONa, Na2SO4, Ba(NO3)2? Для каждой из гидролизующихся солей написать уравнения реакций гидролиза в молекулярной и ионно-молекулярной форме (по I ступени) и указать реакцию водного раствора каждой соли. Какую реакцию среды обнаруживают растворы солей NH4NO3, (NH4)2S, K2CO3, KCl? Ответ подтвердить реакциями. Какую реакцию среды обнаруживают растворы солей Pb(CH3COO)2, ZnCl2, Na3PO4, NaNO3? Ответ 197. подтвердить реакциями. Какую реакцию среды обнаруживают водные растворы солей (NH4)2CO3, NH4Cl, NaCl, Na2CO3, FeCl2? Ответ обосновать реакциями. Какую реакцию среды обнаруживают водные растворы солей NaCN, FeCl3, Ni(NO3)2, K2CO3? Ответ обосновать 199. реакциями. 200. Написать в молекулярной и молекулярно-ионной форме уравнения гидролиза солей NH4Cl, (NH4)2S, (NH4) 3PO4, K2SO3. Указать реакцию среды водных растворов этих солей. Составить электронные уравнения и закончить уравнения следующих реакций: 201 - 214 $KMnO4 + KI + H2SO4 \rightarrow K2SO4 + MnSO4 + I2 + H2O$ $H2S + H2O2 \rightarrow H2SO4 + H2O$ $FeCl3 + SnCl2 \rightarrow FeCl2 + SnCl4$ $HClO3 \rightarrow ClO2 + HClO4 + H2O$ $As + HNO3 + H2O \rightarrow H3AsO3 + NO$ $HCl + MnO2 \rightarrow MnCl2 + Cl2 + H2O$ $KMnO4 + NH3 \rightarrow KNO3 + MnO2 + KOH + H2O$ $K2Cr2O7 + HClO4 + HI \rightarrow Cr(ClO4)3 + KClO4 + I2 + H2O$

 $I2 + C12 + H2O \rightarrow HIO3 + HC1$

 $KClO3 + HCl \rightarrow Cl2 + KCl + H2O$

204.

```
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 \rightarrow MnSO4 + K2SO4 + H2O
K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 \rightarrow Cr2(SO4)3 + S + K2SO4 + H2O
          C12 + KOH \rightarrow KC1 + KC1O3 + H2O
K2Cr2O7 + K2SO3 + H2SO4 \rightarrow Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
PbO2 + MnSO4 + HNO3 \rightarrow PbSO4 + HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O
          NaCrO2 + NaOH + Br2 \rightarrow Na2CrO4 + NaBr + H2O
K2Cr2O7 + HClконц. \rightarrow KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O
PbS + H2O2 \rightarrow PbSO4 + H2O
          KClO3 \rightarrow KClO4 + KCl
KClO3 \rightarrow KCl + O2
(NH4)2Cr2O7 \rightarrow N2 + Cr2O3 + H2O
          Cu(NO3)2 \rightarrow CuO + NO2 + O2
Na2SnO2 + Bi(NO3)3 + NaOH \rightarrow Na2SnO3 + Bi + NaNO3 + H2O
H2O2 + PbS \rightarrow PbSO4 + H2O
          FeSO4 + HNO3 + H2SO4 \rightarrow Fe2(SO4)3 + NO + H2O
H2SO3 + C12 + H2O \rightarrow H2SO4 + HC1
P + HNO3 + H2O \rightarrow H3PO4 + NO
          P + H2O \rightarrow PH3 + H3PO3
HClO + H2O2 \rightarrow HCl + O2 + H2O
MnSO4 + KMnO4 + H2O \rightarrow MnO2 + K2SO4 + H2SO4
          NaBr + MnO2 + H2SO4 \rightarrow MnSO4 + Na2SO4 + Br2 + H2O
Au + HNO3 + HC1 \rightarrow AuC13 + NO + H2O
H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 \rightarrow S + Cr2(SO4)2 + K2SO4 + H2O
          HgS + HNO3 + HC1 \rightarrow HgC12 + S + NO + H2O
KNO2 + KI + H2SO4 \rightarrow NO + I2 + K2SO4 + H2O
HClO3 \rightarrow ClO2 + HClO4 + H2O
          HCl + K2Cr2O7 \rightarrow Cl2 + CrCl3 + KCl + H2O
213
HBr + H2SO4 \rightarrow SO2 + Br2 + H2O
KMnO4 + KNO2 + H2SO4 \rightarrow MnSO4 + KNO3 + K2SO4 + H2O
          K2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 \rightarrow Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + K2SO4 + H2O
H2O2 \rightarrow O2 + H2O
KNO2 + PbO2 + HC1 \rightarrow KNO3 + PbC12 + H2O
          Закончить уравнения реакций, учитывая, что в кислой среде марганец восстанавливается до Mn2+, в
нейтральной до Mn4+, в щелочной до Mn6+
KMnO4 + K2SO3 + H2SO4 \rightarrow
KMnO4 + K2SO3 + H2O \rightarrow
KMnO4 + K2SO3 + KOH \rightarrow
          Учитывая, что хром восстанавливается до трехвалентного состояния, закончить уравнения реакций:
K2Cr2O7 + FeSO4 + H2SO4 \rightarrow
K2Cr2O7 + KNO2 + H2SO4 \rightarrow
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 \rightarrow
217.
          Исходя из строения атомов элементов, указать, какие из приведенных ниже ионов могут быть восстановителями:
Zn2+, Fe2+, K+, S2<sup>-</sup>. Привести примеры соответствующих реакций.
218.
          Исходя из строения атомов элементов, указать, какие из приведенных ниже ионов могут быть окислителями:
Al3+, Fe3+, F<sup>-</sup>, Cr6+. Проиллюстрировать ответ реакциями.
219
          Какие из приведенных ниже ионов могут проявлять и окислительные и восстановительные свойства: SO42-,
SO32<sup>-</sup>, S2<sup>-</sup>, ClO4<sup>-</sup>, NO2<sup>-</sup>, NO3<sup>-</sup>.Ответ проиллюстрировать реакциями.
220
          Указать, какие из приведенных ниже веществ являются окислителями, а какие восстанови-телями: КМпО4, Zn,
F2, HCl, HClO4. Ответ мотивировать.
221.
          Составить схемы двух гальванических элементов, в одном из которых железо служило бы анодом, а в другом -
катодом. Привести электронные уравнения реакций, протекающих при работе элементов.
222.
          Составить схемы двух гальванических элементов, в одном из которых цинк - отрицатель-ный электрод, в другом

    положительный. Написать электронные уравнения реакций, протека-ющих при работе элементов.

223.
          Рассчитать э.д.с. гальванического элемента, состоящего из цинкового электрода, погружен-ного в 0,1 М раствор
сульфата цинка, и водородного электрода, погруженного в дистиллиро-ванную воду.
224
          Концентрационная гальваническая цепь составлена магниевыми электродами, погружен-ными в раствор MgSO4
разной концентрации:
Mg | 0,1 M MgSO4 || 0,0001 M MgSO4 | Mg
Рассчитать э.д.с. этого элемента
          Вычислить э.д.с. гальванического элемента
225.
Zn \mid Zn(NO3)2 \mid AgNO3 \mid Ag
зная, что растворы децимолярны. Какие процессы протекают на электродах при работе этого элемента?
226.
          Использовав табл. 5 Приложения, вычислить э.д.с. элемента, составленного из наиболее и наименее активного
```

металлов, погруженных в 0,1 М растворы их солей. Какие процессы протекают на электродах при работе этого элемента?

элементов, равна 1,1 В. Изменится ли эта величина, если использовать 0,01 М растворы? Ответ обосновать.

в 0,01 М растворы нитратов этих металлов. Какие процессы протекают на электродах элемента?

Э.д.с. элемента, состоящего из медного и цинкового электродов, погруженных в 1 М растворы солей этих

Рассчитать э.д.с. гальванического элемента, состоящего из алюминиевой и серебряной пластинок, погруженных

227.

TI: 2025 35.03.10 z.plx crp. 15

229. Рассчитать потенциал нормального водородного электрода, погруженного в: a) дистилли-рованную воду; б) раствор с pH = 3; в) раствор с pH = 10.

230. Рассчитать э.д.с. гальванического элемента

Cr | 0,0001 M Cr(NO3)3 || 0,01 M Pb(NO3)2 | Pb

Какие процессы протекают на электродах элемента во время его работы?

- 231. Что такое коррозия металлов? Какие виды коррозии Вы знаете? Перечислить основные ме-тоды защиты металлов от коррозии.
- 232. Привести примеры катодного и анодного покрытий железа. Составить электронные урав-нения процессов, протекающих при нарушении целостности покрытий в агрессивной среде.
- 233. Составить электронные уравнения процессов коррозии хромированного железа в кислотной среде, протекающих при нарушении покрытия.
- 234. Сплав меди с никелем находится в водной среде, насыщенной кислородом. Составить электронные уравнения процесса коррозии сплава.
- 235. В каких случаях используются анодные, а в каких катодные защитные покрытия? Приве-сти примеры и составить электронные уравнения процессов коррозии, протекающих при нару-шении катодного и анодного покрытий.
- 236. Алюминий склепан с железом. Какой из металлов будет подвергаться коррозии, если эти металлы попадут в кислотную среду? Составить электронные уравнения процессов коррозии.
- 237. Как протекает процесс коррозии латуни (сплава меди с цинком) в агрессивной среде? Со-ставить электронные уравнения процесса коррозии.
- 238. Как протекает процесс коррозии бронзы (сплава меди и олова) в агрессивной среде? Соста-вить электронные уравнения этого процесса.
- 239. Составить электронные уравнения процесса коррозии никелированного железа в кислотной среде в случае нарушения покрытия.
- 240. Олово спаяно с серебром. Какой из металлов будет разрушаться в агрессивной среде? Со-ставить электронные уравнения процесса коррозии.
- 241. Выход по току при получении металлического кальция при электролизе расплава хлорида кальция равен 70 %. Сколько электричества надо пропустить через электролит, чтобы получить 400 г кальция?
- 242. Сколько алюминия можно получить при электролизе расплава Al2O3, если в течение 0,5 часа пропускать ток силой 10000 А при выходе по току 85 %? Составить схему электролиза.
- 243. При рафинировании меди током 20 А за 4 часа выделяется 78 г меди. Рассчитать выход по току.
- 244. Какие металлы нельзя получить электролизом водных растворов солей? Почему? Составить схему электролиза водного раствора фторида кальция CaF2 на угольном аноде.
- 245. Определить объем водорода (условия нормальные), выделившегося при пропускании тока силой 10 A в течение 30 минут через водный раствор хлорида калия КСІ. Составить схему электролиза на платиновых электродах.
- 246. Сколько литров кислорода, измеренного при нормальных условиях, выделится при пропускании тока силой 5 A в течение 2 часов через водный раствор NaOH? Составить схему электролиза.
- 247. Сколько времени потребуется на разложение 3 молей воды током силой 20 А?
- 248. Составить схему электролиза водного раствора SnCl2 с платиновым анодом. Сколько олова выделится на катоде в то время, как на аноде образовалось 44,8 л хлора, измеренного при нор-мальных условиях?
- 249. Через раствор NiCl2 в течение 1,5 часов пропускали ток силой 8 А. На сколько грамм уменьшилась масса никелевого анода? Составить схему электролиза.
- 250. Стальная деталь общей площадью поверхности 0,08 м2 погружена в раствор соли никеля и используется как катод. Плотность никеля 8900 кг/м3. Какова толщина образовавшегося нике-левого покрытия, если ток силой 3,15 А пропускался в течение 42 минут?
- 251. Через растворы AgNO3 и Cu(NO3)2 пропустили равные количества электричества. В первом случае на катоде выделилось 12,32 г серебра. Сколько граммов меди выделилось на катоде из второго раствора? Составить схемы электролиза этих растворов с инертным анодом.
- 252. Составить схемы электролиза расплава и водного раствора KF на инертном аноде. Сколько времени потребуется для получения 3,9 г калия, если сила тока равна 20 A?
- 253. Сколько времени нужно пропускать ток силой 3 А через раствор сульфата цинка ZnSO4, чтобы покрыть пластинку площадью 0,1 м2 слоем цинка толщиной 2,5•10-5 м? Плотность цинка 7133 кг/м2.
- 254. При прохождении тока силой 2 А через раствор соли двухвалентного металла в течение 1 часа на катоде выделилось 4,194г металла. Найти атомную массу металла.
- 255. Через раствор хлорида цинка ZnCl2 в течение 30 минут пропускали ток, причем на катоде выделилось 0,25 г цинка. Амперметр показывал ток 0,4 А. Какова ошибка в показаниях ампер-метра?
- 256. Составить схему электролитического получения LiOH из какой-либо соли лития. Какое количество электричества необходимо для получения 1 кг LiOH при выходе по току 80 %?
- 257. При электролизе водного раствора CrCl3 током силой 4 А масса катода увеличилась на 16 г. Сколько времени продолжался процесс электролиза? Составить его схему при условии использования инертного анода.
- 258. Водный раствор содержит смесь катионов Cu2+, Fe2+, Zn2+. В какой последовательности бу-дут восстанавливаться эти ионы при электролизе? В течение какого времени надо пропускать ток силой 2,5 А через раствор, чтобы выделить по 1 г указанных металлов?
- 259. При силе тока 4 А в течение 20 минут на катоде выделится 4,542 г некоторого металла. Рассчитать электрохимический эквивалент этого металла.
- 260. При электролизе раствора сульфата цинка на аноде образовалось 5,6 л газа, измеренного при нормальных условиях. Сколько цинка выделилось за то же время на катоде? Составить схему электролиза на платиновых электродах.
- 261. Что такое дисперсные системы? В чем различие между моно- и полидисперсными, свобод-но- и связнодисперсными системами? К каким дисперсным системам относится почва?

/TI: 2025_35.03.10_z.plx ctp. 16

262. Что такое адсорбция? Как изменится адсорбционная способность веществ при дроблении кубических частиц с длиной ребра 5 мкм до частиц с длиной ребра 10-7 см? Ответ подтвердить расчетом суммарной поверхности 1 см3 вещества.

- 263. Раствор (золь) коллоидной камфоры в 1 см3 содержит 2•108 глобул этого вещества. Прини-мая диаметр глобулы равным 10-6 мм, подсчитать общую поверхность диспергированного ве-щества в 1 л золя.
- 264. Чем различаются золь и гель? Возможен ли переход из золя в гель и обратно? Ответ под-твердить примерами.
- 265. Что такое коллоиды? В чем причина коагуляции коллоидов?
- 266. Что такое пептизация коллоидов? Как гидроксид железа (III) можно перевести из коагулята в золь и из золя в коагулят?
- 267. Написать формулу коллоидной мицеллы, образующейся при взаимодействии сильно раз-бавленных растворов AgNO3 и KCl при небольшом избытке KCl. Указать ионы, образующие двойной электрический слой.
- 268. Написать формулу коллоидной мицеллы, образующейся при взаимодействии сильно раз-бавленных растворов AgNO3 и KCl при небольшом избытке AgNO3. Указать ионы, образующие адсорбционную часть двойного электрического слоя.
- 269. Написать формулу коллоидной мицеллы, образующейся при взаимодействии сильно раз-бавленных растворов Na2SiO3 и HCl при небольшом избытке Na2SiO3. Указать ионы, образую-щие: а) потенциалопределяющий слой; б) двойной электрический слой.
- 270. Написать формулу коллоидной мицеллы, образующейся при взаимодействии сильно раз-бавленных растворов Na2SiO3 и HCl при небольшом избытке HCl. Указать ионы, образующие диффузную часть двойного электрического слоя.
- 271. Что Вы знаете о коагулирующем действии электролитов? Какая из солей NaCl, Na2SO4, Na3PO4 оказывает большее воздействие на коагуляцию коллоидов? Ответ мотивировать.
- 272. Что такое порог коагуляции? Как он будет изменяться в ряду солей NaCl BaCl2 FeCl3? Ответ мотивировать.
- 273. Как можно стабилизировать дисперсные системы? Что такое стабилизатор? Какие виды стабилизации дисперсных систем Вы знаете? Что такое защитные коллоиды и в чем механизм их действия?
- 274. Что произойдет, если к золю Fe(OH)3 прилить раствор Na2SO4? Изменится ли результат, если к золю предварительно добавить раствор крахмала? Ответ мотивировать.
- 275. В две колбы с золем MnO2 прилили следующие растворы: в первую NaCl, во вторую сна-чала раствор мыла, а затем NaCl. Что произойдет в каждой колбе? Ответ мотивировать.
- 276. Что произойдет при сливании коллоидных растворов AgCl (стабилизатор KCl) и Fe(OH)3 (стабилизатор FeCl3)? Ответ подтвердить формулами коллоидных мицелл.
- 277. Что произойдет при сливании коллоидных растворов H2SiO3 (стабилизатор Na2SiO3) и Fe(OH)3 (стабилизатор FeCl3)? Ответ подтвердить формулами коллоидных мицелл.
- 278. От чего зависит адсорбция газов и паров на поверхности твердых тел? Что такое гидро-фильные и гидрофобные адсорбенты? Назвать важнейшие адсорбенты.
- 279. Отличие растворов от дисперсных систем. Истинные и коллоидные растворы. Может ли NaCl образовывать истинные и коллоидные растворы? Ответ мотивировать.
- 280. Что такое сорбция? Хемосорбция? Написать уравнения хемосорбционных процессов по-глощения СО2 водой и оксидом кальция, а также поглощения аммиака водой.
- 281. Укажите, к какому виду полимеров относится полиэтилен по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полиэтилена, укажите мономер и метод получения полимера. Может ли полиэтилен иметь атактическое строение? Ответ мотивируйте. Как используется полиэтилен?
- 282. Укажите, к какому виду полимеров относится полистирол по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полистирола, укажите мономер и метод получения полимера. Какое строение стереорегуляр-ное или нерегулярное имеет полистирол? Ответ мотивируйте. Как используется полистирол?
- 283. Укажите, к какому виду полимеров относится полихлорвинил по происхождению, химиче-ской природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение полу-чения полихлорвинила, укажите мономер и метод получения полимера. К каким полимерам атактическим или изотактическим относится этот полимер? Ответ мотивируйте. Как исполь-зуется полихлорвинил?
- 284. Укажите, к какому виду полимеров относится полиметилакрилат по происхождению, хи-мической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полиметилакрилата, укажите мономер и метод получения полимера. Какое строение стереорегулярное или нерегулярное имеет этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется полиметилакрилат?
- 285. Укажите, к какому виду полимеров относится полиакрилонитрил по происхождению, хи-мической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полиакрилонитрила, укажите мономер и метод получения полимера. К каким поли-мерам карбоцепным или гетероцепным относится полиакрилонитрил? Ответ мотивируйте. Как используется полиакрилонитрил?
- 286. Укажите, к какому виду полимеров относится бутадиеновый каучук по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения бутадиенового каучука, укажите мономер и метод получения полимера. Имеет ли этот полимер цис- и транс-формы? Ответ мотивируйте. Как используется бутадиеновый каучук?
- 287. Укажите, к какому виду полимеров относится бутадиен-стирольный каучук по происхож-дению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения бутадиен-стирольного каучука, укажите мономеры и метод получения полимера. К каким полимерам атактическим или изотактическим относится этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется бутадиен-стирольный каучук?
- 288. Укажите, к какому виду полимеров относится бутадиен-нитрильный каучук по происхож-дению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения бутадиен-нитрильного

TI: 2025 35.03.10 z.plx crp. 17

каучука, укажите мономеры и метод получения полимера. Какое строение – стереорегулярное или нерегулярное – имеет этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется бутадиен-нитрильный каучук?

- 289. Укажите, к какому виду полимеров относится фенолформальдегидная смола по происхож-дению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения фенолформальдегидной смолы, укажите мономеры и метод получения полимера. К каким полимерам карбоцепным или гетероцепным относится этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется фенолформальдегидная смола?
- 290. Укажите, к какому виду полимеров относится полиэтилентерефталат по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полиэтилентерефталата, укажите мономеры и метод получения полимера. Имеет ли этот полимер цис- и транс-формы? Ответ мотивируйте. Как используется полиэтилентерефталат?
- 291. Укажите, к какому виду полимеров относится нейлон по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения нейлона, укажите мономер и метод получения полимера. К каким полимерам карбоцепным или гетероцепным относится этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется нейлон?
- 292. Укажите, к какому виду полимеров относится политетрафторэтилен по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения политетрафторэтилена, укажите мономер и метод получения полимера. Может ли этот полимер иметь атактическое строение? Ответ мотивируйте. Как используется политетрафторэтилен?
- 293. Укажите, к какому виду полимеров относится полиметилметакрилат по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение получения полиметилметакрилата, укажите мономер и метод получения полимера. К каким полимерам атактическим или изотактическим относится этот полимер? Ответ мотивируйте. Как используется полиметилметакрилат?
- 294. Укажите, к какому виду полимеров относится поливинилацетат по происхождению, хими-ческой природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнение по-лучения поливинилацетата, укажите мономер и метод получения полимера. Какое строение стереорегулярное или нерегулярное имеет этот полимер? Ответ мотивируйте. Как использу-ется поливинилацетат?
- 295. Укажите, к какому виду полимеров относится капрон по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Какими методами можно получить капрон? Напишите уравнения получения этого полимера, укажите мономеры. К каким полимерам карбоцепным или гетероцепным относится капрон?
- 296. Укажите, к какому виду полимеров относится резина по происхождению, химической при-роде, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Укажите мономер и метод получения резины. Чем резина отличается от эбонита? Как используются резина и эбонит?
- 297. Какие разновидности полиизопрена существуют? К каким видам полимеров они относятся по происхождению, форме макромолекул, по отношению к нагреванию? Напишите уравнения синтеза этих разновидностей полиизопрена, укажите мономеры. Как используется полиизо-прен?
- 298. Что такое полиамидные смолы? Какие разновидности полиамидных смол существуют? Укажите, к какому виду полимеров они относятся по происхождению, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию. Напишите уравнения получения полиамидных смол, укажите мономеры. Как используются полиамидные смолы?
- 299. Какие виды каучука существуют? К какому виду полимеров они относятся по происхожде-нию, химической природе, форме макромолекул, по отношению к нагреванию? Напишите уравнения синтеза разных видов каучука, укажите мономеры. Как используются эти полимеры?
- 300. Перечислите карбоцепные полимеры, полученные методом полимеризации, не содержащие в основной цепи кратных связей. Напишите уравнения их получения, укажите мономеры. Какие из этих полимеров могут иметь атактическое строение? Ответ мотивируйте.
- 301. Что такое рН-индикаторы? Какие индикаторы Вы знаете? Присутствие каких ионов в рас-творе можно обнаружить при помощи индикаторов? Привести примеры.
- 302. В пять пробирок, содержащих растворы хлоридов натрия, меди (II), бария, алюминия и же-леза (III), добавили раствор КОН. Указать в каких именно пробирках находятся растворы этих солей, если в 1-й пробирке выпал осадок белого цвета, в 4-й синего, в 5-й бурого цвета, а во 2-й и 3-й осадка не образовалось. При помощи какого реагента можно определить состав со-держимого 2-й и 3-й пробирок? Ответ подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионномолекулярной форме.
- 303. В пять пробирок, содержащих растворы хлоридов калия, аммония, магния, железа (II) и кальция, добавили раствор NaOH. Указать в каких именно пробирках находятся данные соли, если в 1-й пробирке выпал осадок зеленоватого цвета, во 2-й и 4-й белого цвета, причем во 2-й он растворился при разбавлении водой, а в 3-й и 5-й пробирках осадка не образовалось. Как можно определить состав растворов в 3-й и 5-й пробирках? Ответ подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 304. Указать два химических реактива, при помощи которых можно различить растворы хлори-дов магния, кальция и бария. Написать в молекулярной и ионно-молекулярной форме уравне-ния реакций, протекающих между этими реактивами и каждой из солей.
- 305. При помощи каких химических реактивов можно различить следующие соединения натрия: карбонат, хлорид, сульфат, фосфат и гидроксид натрия. Написать уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 306. При помощи какого универсального реактива можно определить, в какой из пяти пробирок находятся растворы NaCl, NaBr, NaI, Na2S, CH3COONa? Написать уравнения реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме и указать цвет осадков.
- 307. Написать химические формулы веществ, находящихся в 3-х колбах, если: 1) растворы окрашивают пламя горелки в фиолетовый цвет; 2) при приливании раствора AgNO3 в образцах из 1-й и 3-й колб выпал творожистый осадок белого цвета, а в образце из 2-й колбы желтого цвета; 3) при добавлении H2SO4 в образце из 3-й колбы произошло бурное выделение газооб-разного вещества, которое вызвало помутнение раствора Ca(OH)2. Ответ подтвердить уравне-

ниями соответствующих реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.

308. При помощи каких качественных реакций можно различить 2 минеральных удобрения (NH4)2SO4 и КС1? Ответ подтвердить уравнениями соответствующих реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме, указать цвет осадков.

- 309. Написать химические формулы веществ, находящихся в 3-х колбах, если: 1) раствор окра-шивает пламя горелки в фиолетовый цвет (образцы из колб 1-й и 2-й) и желтый (образец из 3-й колбы); 2) при приливании раствора AgNO3 в образце из колбы №2 выпал творожистый осадок белого цвета; 3) при добавлении раствора BaCl2 в образцах из 1-й и 3-й колб выпадает белый осадок; 4) при добавлении H2SO4 изменений не происходит. Ответ подтвердить уравнениями соответствующих реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 310. Как при помощи воды и азотной кислоты распознать четыре порошка соду, мел, сульфат натрия и гипс? Ответ подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 311. В четырех пакетах содержатся следующие вещества: сульфат алюминия, нитрат бария, хлорид аммония, сульфит натрия. Используя раствор гидроксида калия и открытый им сульфат алюминия, обнаружить все остальные вещества. Ответ подтвердить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 312. Как при помощи перманганата калия KMnO4 можно различить: а) сульфаты железа (II) и (III); б) нитрат и нитрит калия? Ответ подтвердить уравнениями возможных окислительно-восстановительных реакций.
- 313. Как при помощи дихромата калия K2Cr2O7 можно различить: а) сульфаты железа (II) и (III); б) нитрат и нитрит калия? Ответ подтвердить уравнениями возможных окислительно-восстановительных реакций.
- 314. В трех банках без этикеток находятся следующие вещества: сульфат натрия, сульфит натрия, сульфид натрия. Как, имея в своем распоряжении лишь один реактив (какой?), узнать, где какая соль находится? Написать уравнения реакции между реактивом и каждой из солей в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 315. Как при помощи гидроксида натрия, нитрата серебра и хлорида бария определить, какое из удобрений сульфат аммония, нитрат натрия, хлорид аммония представляет собой исследуе-мый образец удобрения? Ответ пояснить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме с указанием цвета образовавшихся осадков.
- 316. Как при помощи гидроксида натрия, нитрата серебра и карбоната натрия определить, какое из удобрений нитрат кальция, фосфат аммония, хлорид калия представляет собой исследуе-мый образец удобрения? Ответ пояснить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме с указанием цвета образовавшихся осадков.
- 317. Как при помощи гидроксида натрия, нитрата серебра и соляной кислоты определить, какое из удобрений нитрат аммония, карбонат калия, фосфат калия представляет собой образец удобрения? Ответ пояснить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной фор-ме с указанием цвета образовавшихся осадков.
- 318. При помощи каких качественных реакций можно подтвердить состав трех веществ: (NH4)2SO4, KCl, Na2S? Написать уравнения соответствующих реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 319. Назвать наиболее важные соли железа и указать их практическое значение. При помощи каких реакций можно обнаружить присутствие ионов железа (II) и (III) в растворе? Ответ под-твердить уравнениями реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.
- 320. При помощи каких качественных реакций можно подтвердить состав трех веществ: K3PO4, Na2CO3, BaCl2? Написать уравнения соответствующих реакций в молекулярной и ионно-молекулярной форме.

6.2. Темы письменных работ

Контрольная работа

6.3. Процедура оценивания

Оценка сформированности компетенций у обучающихся и выставление оценки по дисциплине ведется следующим образом : для студентов заочной и очно-заочной формы обучения оценивается по пятибалльной шкале, оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» / «зачтено» или «не зачтено».

6.4. Перечень видов оценочных средств

Контрольная работа.

Итоговый контроль.

	7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
	7.1. Рекомендуемая литература						
	7.1.1. Основная литература						
	Авторы, составители Заглавие Издательство, год						
Л1.1	Шалашова О.Ю.	Общая химия: учеб. пособие для студ. оч. формы обуч. направл. "Педагогическое образование"	Новочеркасск, 2020, http://biblio.dongau.ru/MegaPr oNIMI/UserEntry? Action=Link_FindDoc&id=35 2795&idb=0				
Л1.2	Шалашова О.Ю., Пятницына Е.В.	Химия: учеб. пособие для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. "Лесное дело", "Ландшафтная архитектура", "Экология и природопользование"	Новочеркасск, 2022, http://biblio.dongau.ru/MegaPr oNIMI/UserEntry? Action=Link_FindDoc&id=42 7808&idb=0				

	Авторы, составители	Заглави	re	Издательство, год		
Л1.3	Тарасенко Е. В., Денисова О. Н.	Химия: учебно-методическое посо	Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2023, https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=708211			
Л1.4	Зыкова И. Д., Наймушина Л. В., Прокушкина М. П., Щербакова О. Ю.	Химия: учебное пособие	Красноярск: Сибирский федеральный университет (СФУ), 2021, https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=706627			
		7.1.2. Дополнительн	ая литература			
	Авторы, составители	Заглави	ie	Издательство, год		
Л2.1	Апарнев А. И., Казакова А. А.	Химия: сборник задач и упражнен пособие	ий: учебно-методическое	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019, https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=573735		
Л2.2	Александрова Т. П., Апарнев А. И., Казакова А. А., Карунина О. В.	Аналитическая химия: учебное пос	Аналитическая химия: учебное пособие			
Л2.3	Дрововозова Т.И.	Аналитическая химия (количествен пособие для студ. направл. "Педаго направл. "Химия"	раде=book&id=573734 Новочеркасск, 2021, http://biblio.dongau.ru/MegaPr oNIMI/UserEntry? Action=Link_FindDoc&id=38 3829&idb=0			
Л2.4	Емельянова Е. О.	Общая химия: практикум		Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019, https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=577072		
Л2.5	Брюзгина А. В., Урусова А. С., Гаврилова Л. Я.	Общая и неорганическая химия: пр	Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2020, https://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=698907			
		7.1.3. Методически				
ЛЗ.1	Авторы, составители Дрововозова Т.И., Шалашова О.Ю., Пятницына Е.В.	Заглавие Химия: лабораторный практикум для студентов всех направлений		Издательство, год Новочеркасск, 2018, http://biblio.dongau.ru/MegaPr oNIMI/UserEntry? Action=Link_FindDoc&id=23 6898&idb=0		
Л3.2	Новочерк. инж мелиор. ин-т Донской ГАУ; сост. О.Ю. Шалашова, Т.И. Дрововозова	Химия: методические указания по выполнению контрольной работы дормы обучения направлений "Лесархитектура", "Экология и природо	для студентов заочной сное дело", "Ландшафтная опользование"	Hовочеркасск, 2020, http://biblio.dongau.ru/MegaPr oNIMI/UserEntry? Action=Link_FindDoc&id=33 7410&idb=0		
		ень ресурсов информационно-теле				
7.2.1	информационно-с системы	правочные и поисковые	http://www.chem.msu.su/rus/	elibrary/		
	СИСТЕМЫ	7.3 Перечень программ	 ного обеспечения			
7.3.1	Yandex browser MS Windows XP,7		Сублицензионный договор «СофтЛайн Трейд»	№502 от 03.12.2020 г. AO		

VII: 2025 35.03.10 z.plx crp. 20

7.3.3	Microsoft Te	eams	Предоставляется бесплатно		
7.3.4	MS Office p	rofessional;	Сублицензионный договор №502 от 03.12.2020 г. АО «СофтЛайн Трейд»		
7.3.5	заимствован «Антиплаги «Программи	ая система для обнаружения текстовых ний в учебных и научных работах нат. ВУЗ» (интернет-версия);Модуль ный комплекс поиска текстовых ний в открытых источниках сети	Лицензионный договор № 8047 от 30.01.2024 г АО «Антиплагиат»		
		7.4 Перечень информационн	ных справочных систем		
7.4.1	Базы данны +)	х ООО "Пресс-Информ" (Консультант	https://www.consultant.ru		
7.4.2	Базы данны библиотека	х ООО Научная электронная	http://elibrary.ru/		
	8. MAT	ГЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСІ	ТЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)		
8.1	2313	Специальное помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории: Набор демонстрационного оборудования (переносной): ноутбук марки Asusmodel/X552M – 1 шт., проектор Acerx113PH – 1шт., экран настенный – 1 шт.; Учебно-наглядные пособия – 15 шт.; Рабочие места студентов; Рабочее место преподавателя.			
8.2	2321	средствами обучения, служащими д демонстрационного оборудования (проектор Acerx113PH – 1шт., экран	говано специализированной мебелью и техническими для представления информации аудитории: Набор переносной): ноутбук марки Asusmodel/X552M – 1 шт., настенный – 1 шт.; Учебно-наглядные пособия – 9 шт.; нтов; Рабочее место преподавателя.		
8.3	2305	Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации и оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду НИМИ Донской ГАУ: Компьютеры марок: Intel Celeron 430 – 1 шт.; Celeron 366 – 1 шт.; Femoza – 2 шт.; Монитор VS – 1 шт.; Монитор OPTIQUESTQ – 2 шт.; Монитор Intel Celeron 430 – 1 шт.; Кафедральная библиотека; Столы компьютерные – 6 шт.; Стол-тумба – 5 шт.; Стулья – 16 шт.; Тематические плакаты – 5 шт.; Доска – 1 шт.; Рабочие места студентов; Рабочее место преподавателя.			
8.4	2317	— 5 шт.; Доска — 1 шт.; Раоочие места студентов; Раоочее место преподавателя. Специальное помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления информации аудитории: Набор демонстрационного оборудования (переносной): ноутбук марки Asusmodel/X552M — 1 шт., проектор Acerx113PH — 1шт., экран настенный — 1 шт.; Учебно-наглядные пособия — 9 шт.; Доска- 1 шт.; Рабочие места студентов; Рабочее место преподавателя.			

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- 1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ (введено в действие приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.). / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015. Режим доступа: http://www.ngma.su 27.08.2016
- 2. Дрововозова, Т.И. Химия [Электронный ресурс] : лаб. практикум для студ. всех направл. / Т. И. Дрововозова, О. Ю. Шалашова, Е. В. Пятницына ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ. Новочеркасск, 2018.
- 3. Химия: метод. указания по изуч. курса и вып. контр. работы для студ. заоч. формы обуч. / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ, Сост.: О.Ю. Шалашова, Т.И. Дрововозова, Новочеркасск, 2020.